Кашнол



Код АТХ:

- R05CA

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Бромгексин
- Гвайфенезин
- Рацементол
- Сальбутамол

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички
Госреестр[мнн мнн мнн мнн] Википедия[мнн мнн мнн мнн]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Сироп в виде жидкости красного цвета с запахом малины и сладким вкусом.

	5 мл
сальбутамол (в форме сульфата)	1 мг
бромгексина гидрохлорид	2 мг
гвайфенезин	50 мг
ментол	500 мкг

Вспомогательные вещества: сахароза, лимонной кислоты моногидрат, натрия эдетат, натрия бензоат, калия сорбат, пропиленгликоль, глицерол, сорбитола раствор 70%, ментол, ароматизатор малиновый, вода очищенная, краситель пунцовый 4R.

100 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с мерным стаканом - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, состоящий из ингредиентов, применяемых для симптоматического лечения кашля при различных легочных заболеваниях. Обладает бронхолитическим, муколитическим и отхаркивающим действием.

Сальбутамол оказывает бронхолитическое действие путем селективного действия на бета$_2$-адренергические рецепторы бронхов.

Бромгексин разжижает мокроту, увеличивает ее объем. Муколитическое действие обусловлено способностью деполимеризовать и разжижать мукопротеины и мукополисахаридные волокна.

Гвайфенезин обладает отхаркивающим действием. Уменьшает адгезивность, поверхностное натяжение мокроты, что улучшает ее отхождение.

Ментол обладает слабым антисептическими свойствами оказывает успокаивающее действие и уменьшает раздражение слизистой оболочки дыхательных путей.

Показания к применению:

Острые и хронические бронхо-легочные заболевания, сопровождающиеся затруднением отхождения мокроты:

— бронхиальная астма;

— трахеобронхит;

— обструктивный бронхит;

— пневмония;

— эмфизема легких;

— пневмокониоз и др.

Относится к болезням:

- Астма
- Бронхит
- Пневмокониоз
- Пневмония
- Трахеит
- Трахеобронхит
- Эмфизема легких

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата;

— беременность;

— период лактации;

— детский возраст до 3-х лет;

— тахиаритмия;

— миокардит;

— пороки сердца;

— декомпенсированный сахарный диабет;

— тиреотоксикоз;

— глаукома;

— печеночная или почечная недостаточность;

— язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения.

С *осторожностью* применять у пациентов с сахарным диабетом, артериальной гипертензией, язвенной болезнью желудка, и двенадцатиперстной кишки в стадии ремиссии.

Способ применения и дозы:

Препарат Кашнол назначают **взрослым и детям старше 12 лет** по 10 мл (2 чайные ложки) 3 раза/сут.

Детям от 6 до 12 лет - 5-10 мл (1-2 чайные ложки) 3 раза/сут; **детям от 3 до 6 лет** - по 5 мл (1 чайная ложка) 3 раза/сут.

Между применением очередных доз препарата необходим перерыв не менее 6 ч.

Побочное действие:

Иногда: головная боль, головокружение, повышенная нервная возбудимость, нарушение сна, сонливость, тремор, судороги, тошнота, рвота, диарея, обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, учащенное сердцебиение; *возможно* окрашивание мочи в розовый цвет, аллергические реакции (сыпь, крапивница), снижение АД, коллапс.

Передозировка:

О случаях передозировки не сообщалось. Возможно усиление вышеуказанных побочных эффектов.

Лечение симптоматическое.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению при беременности.

При необходимости лечения Кашнолом в период лактации грудное вскармливание следует прекратить.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Другие бета$_2$-адреномиметические средства и теофиллин усиливают действие сальбутамола и увеличивают вероятность появления побочных эффектов.

Кашнол не назначают одновременно с препаратами, содержащими кодеин и другими противокашлевыми средствами, т.к. это затрудняет отхождение разжиженной мокроты.

Входящий в состав препарата Кашнол бромгексин способствует проникновению антибиотиков (эритромицин, цефалексин, окситетрациклин) в легочную ткань.

Не рекомендуется применять препарат Кашнол одновременно с неселективными блокаторами бета-адренорецепторов, такими как пропранолол.

Входящий в состав препарата Кашнол сальбутамол не рекомендуется пациентам, которые получают ингибиторы МАО.

Диуретики и ГКС усиливают гипокалиемический эффект сальбутамола.

Не рекомендуется принимать одновременно с Кашнолом щелочное питье.

Особые указания и меры предосторожности:

При нарушениях функции почек

Противопоказание: почечная недостаточность

При нарушениях функции печени

Противопоказание: печеночная недостаточность

Применение в детском возрасте

Противопоказание: детский возраст до 3 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света и в недоступном для детей месте. Не использовать после истечения срока годности.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Kashnol