# Катеджель с лидокаином

## Код АТХ:

- N01BB52

## Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Лидокаин
- Хлоргексидин

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

| ***Гель для наружного применения*** | **1 г** |
|---|---|
| лидокаина гидрохлорид | 20 мг |
| хлоргексидина дигидрохлорид | 500 мкг |

12.5 г - шприцы гофрированные (1) блистеры (1) - пачки картонные.
12.5 г - шприцы гофрированные (5) блистеры (1) - пачки картонные.
12.5 г - шприцы гофрированные (25) блистеры (1) - пачки картонные.

## Фармакотерапевтическая группа:

- Нейротропные средства
- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Комбинированный препарат для местного применения в урологии.

Лидокаина гидрохлорид обладает местноанестезирующим действием. При высокой дозе и длительном применении на слизистой оболочке концентрация лидокаина в плазме крови составляет 1-2 мкг/мл. При симптомах выраженного воспаления слизистой оболочки мочеиспускательного канала необходимо учитывать повышение резорбции лидокаина.

Хлоргексидин обладает противомикробной активностью в отношении многих грамотрицательных бактерий, но не действует на кислотоустойчивые бактерии, споры, грибы и вирусы. В данной концентрации хлоргексидин способствует предотвращению развития восходящей инфекции уретры и мочевого пузыря.

## Показания к применению:

— для инстилляции в уретру перед введением катетера или других инструментов.

## Относится к болезням:

- Уретрит

## Противопоказания:

— выраженная брадикардия;

— повышенная чувствительность к одному из компонентов препарата.

## Способ применения и дозы:

Для медленной инстилляции в уретру перед введением инструментов (врачом или специально обученным персоналом) необходимо:

— очистить и продезинфицировать наружное отверстие уретры;

— раскрыть блистер, удаляя бумагу с прозрачного корпуса (по возможности только до перетяжки);

— отломать кончик без значительного усилия (по возможности еще в упаковке), при этом необходимо проследить, чтобы кончик был полностью удален во избежание повреждения слизистой мочеиспускательного канала. Для облегчения введения рекомендуется предварительно выдавить каплю препарата.

Инстилляцию следует производить посредством легкого давления на гофрированный шприц. После опорожнения шприца необходимо держать его в сжатом состоянии до изъятия из канала.

Введение инструментов рекомендуется проводить через 10 мин после инстилляции геля.

## Побочное действие:

*Аллергические реакции:* возможны проявления реакций повышенной чувствительности.

*Со стороны сердечно-сосудистой системы:* при многократном применении препарата, при введении в мочевой пузырь или при выраженном воспалении уретры возможно, в связи с увеличением резорбтивной поверхности, уменьшение ЧСС.

## Передозировка:

Данные о передозировке препарата Катеджель с лидокаином не предоставлены.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможно применение при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Данные о лекарственном взаимодействии препарата Катеджель с лидокаином не предоставлены.

## Особые указания и меры предосторожности:

При выраженной брадикардии, при проведении наркоза рекомендуется применять смазывающие средства, не содержащие лидокаин.

В случае “ложного пути” не вводить в уретру (возможно нанесение геля на инструмент или надлобковое отведение мочи).

## Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте (в наружной упаковке), при температуре ниже 25 °С. Срок годности – 5 лет.

*Условия отпуска из аптек*

Препарат отпускается по рецепту.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Katedzhel_s_lidokainom