

Кавехол



Код АТХ:

- [A05AX](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Гранулы для приготовления раствора для приема внутрь коричневого цвета, с характерным запахом.

	1 упаковка
сухой экстракт кавехола (экстракт шелухи какао-бобов)	0.789 г

Вспомогательные вещества: крахмал картофельный высушенный 0.711 г.

- 1.5 г - пакеты (10) - пачки картонные.
- 1.5 г - пакеты (15) - пачки картонные.
- 1.5 г - пакеты (20) - пачки картонные.
- 1.5 г - пакеты (25) - пачки картонные.
- 1.5 г - пакеты (30) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)
- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Кавехол оказывает выраженное желчегонное действие, стимулируя желчеобразовательную и желчевыделительную функцию печени, активизирует синтез желчных кислот; обладает антиоксидантными, мембраностабилизирующими свойствами, проявляет умеренное спазмолитическое действие; при экспериментальном остром токсическом гепатите оказывает гепатопротекторное действие, нормализуя повышенную активность ферментов АЛТ и АСТ, нормализует показатели билирубина, общего холестерина, уровней альфа- и гаммаглобулинов, стимулирует дезинтоксикационную функцию печени, восстанавливает морфофункциональную структуру гепатоцитов; клиническое применение кавехола способствует нормализации функции желчного пузыря и желчевыводящих путей, купированию болевого синдрома, уменьшению тошноты, метеоризма, нормализации стула.

Фармакокинетика

Препарат содержит в качестве активного компонента кавехола экстракт сухой (какао-бобов шелухи экстракт), представляющий собой комплекс биологически активных веществ, в связи с чем проведение фармакокинетических исследований не представляется возможным.

Показания к применению:

В качестве желчегонного средства при:

- дискинезии желчевыводящих путей и желчного пузыря по гипотоническому типу;
- хроническом некалькулезном холецистите;
- постхолецистэктомическом синдроме.

Относится к болезням:

- [Гипотония](#)
- [Дискинезия желчевыводящих путей](#)
- [Холера](#)
- [Холецистит](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- желчнокаменная болезнь;
- возраст до 18 лет.

С осторожностью: больным сахарным диабетом и лицам, находящимся на диете с пониженным содержанием углеводов.

Способ применения и дозы:

Внутрь, по 1 пакету за 30 минут до еды, предварительно растворив содержимое пакета в 100 мл (1/2 стакана) теплой кипяченой воды. Курс лечения - 4 недели. Возможно проведение повторного курса по рекомендации врача через 2-3 месяца. Максимальная разовая доза - 3 г (2 пакета), максимальная суточная доза - 6 г (4 пакета).

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

Развитие передозировки маловероятно. При передозировке возможно усиление побочных дозозависимых эффектов.

Лечение: симптоматическое.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Не рекомендуется применять при беременности и в период грудного вскармливания в связи с отсутствием специальных исследований.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не изучено.

Особые указания и меры предосторожности:

Кавехол

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Больным сахарным диабетом необходимо учитывать, что в одном пакете препарата содержится около 0,7 г углеводов (0,06 ХЕ).

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Применение препарата не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особой концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами).

Применение в детском возрасте

Противопоказано детям до 18 лет.

Условия хранения:

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Kavehol>