

Кедростат



Код АТХ:

- [A05C](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Настойка прозрачная, от красновато-коричневого до коричневого цвета с характерным кедровым запахом.

	1 л
семена сосны кедровой сибирской	100 г

Вспомогательные вещества: этанол 70% достаточное количество для получения 1000 мл препарата.

100 мл - флаконы (1) - пачки картонные.

100 мл - бутылки (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Оказывает гепатопротекторное действие - уменьшает токсическое повреждение печени, развитие жировой дистрофии в гепатоцитах и фибротических изменений в паренхиме печени, тормозит деструктивные и стимулирует репаративные процессы в печени. Обладает антиоксидантной и антигипоксической активностью, которые, по-видимому, лежат в основе механизма гепатопротекторного действия препарата. Способствует снижению связанных с повреждением печени нарушений липидного обмена: тормозит нарастание уровней холестерина, триглицеридов в крови, увеличивает сниженное содержание холестерина липопротеидов высокой плотности, препятствует перекисидации атерогенных (апоВ-содержащих) липопротеидов.

Фармакокинетика

Данные отсутствуют.

Показания к применению:

— токсический (лекарственный) стеатогепатит;

— жировая дегенерация печени (вторичный неалкогольный стеатогепатит) в фазе умеренного или стихающего обострения (в составе комплексной терапии).

Относится к болезням:

- [Жировая дегенерация печени](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- беременность, период грудного вскармливания;
- возраст до 18 лет.

С осторожностью: эпилепсия, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, алкоголизм и другие состояния, при которых не рекомендован прием этанола.

Способ применения и дозы:

Внутрь **взрослым** по 20-40 капель за 10-15 минут до еды 2-3 раза в день.

Длительность лечения 3 недели. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

При применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, возможны головная боль, тошнота, рвота.

Лечение: симптоматическое.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано во время беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении Кедростата с гиполипидемическими средствами системного действия (никотиновая кислота, блокаторы биосинтеза холестерина, фибраты) возможно усиление гиполипидемического действия.

Особые указания и меры предосторожности:

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат содержит не менее 65% этанола. В разовой дозе препарата (20-40 капель) содержится до 0.44 г абсолютного этилового спирта, в максимальной суточной дозе (120 капель) - до 1,32 г абсолютного этилового спирта. В период лечения ввиду наличия в составе препарата этанола необходимо соблюдать осторожность при занятиях потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе при управлении транспортными средствами, работе с движущимися механизмами).

При нарушениях функции печени

Кедростат

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Применяют по показаниям

Применение в детском возрасте

Противопоказано детям до 18 лет.

Условия хранения:

В защищенном от света месте, при температуре от 15 до 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Kedrostat>