

## [Кедровит](#)



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

#### **Форма выпуска, описание и состав**

◇ **Эликсир** в виде жидкости коричневого цвета, со специфическим запахом; в процессе хранения допускается выпадение осадка.

	<b>1 л</b>
семена сосны кедровой сибирской	54 г
плоды боярышника	4 г
плоды аронии черноплодной	2 г
почки березы	1.5 г
корневища с корнями элеутерококка	1 г
цветки боярышника обыкновенного	0.5 г

Вспомогательные вещества: мед натуральный - 50 г, сахароза - 22.7 г, этанол 95% - 421 г, вода очищенная - до 1000 мл.

100 мл - бутылки стеклянные (1) - пачки картонные.

250 мл - бутылки стеклянные (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Обладает общеукрепляющим действием, увеличивает физическую работоспособность, способствует регуляции метаболических процессов в организме.

#### **Фармакокинетика**

Препарат представляет собой водно-спиртовой экстракт из смеси растительного лекарственного сырья и содержит комплекс биологически активных веществ, в связи с чем, проведение фармакокинетических исследований не

представляется возможным.

## Показания к применению:

— для лечения астено-вегетативного синдрома различной этиологии, в период восстановления после перенесенных заболеваний, протекающих с поражением паренхиматозных органов.

## Относится к болезням:

- [Астения](#)

## Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата, в том числе к меду и продуктам пчеловодства;
- острая сердечно-сосудистая и острая почечная недостаточность;
- тяжелые заболевания печени;
- алкоголизм;
- черепно-мозговая травма;
- заболевания головного мозга;
- дефицит сахаразы/изомальтазы;
- непереносимость фруктозы;
- глюкозо-галактозная мальабсорбция;
- возраст до 18 лет.

## Способ применения и дозы:

Внутрь по 2-3 чайные ложки (10-15 мл), разведенные в 100 мл воды. 2 раза в день за 10-15 минут до еды. Курс лечения 5-7 дней. При необходимости курс лечения может быть увеличен до 2-3 недель после консультации с врачом. Перед употреблением взбалтывать.

## Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Если на фоне приема препарата Ваше состояние ухудшилось, и Вы заметили какие-либо побочные эффекты, не указанные в данной инструкции, обратитесь к врачу.

## Передозировка:

При применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, возможны головная боль, тошнота, рвота. Лечение симптоматическое.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

## **Кедровит**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

При одновременном применении с никотиновой кислотой, гиполипидемическими средствами (ингибиторами абсорбции холестерина, фибратами) возможно усиление гиполипидемического действия.

Если Вы принимаете другие лекарственные препараты, перед приемом препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

В составе препарата содержится сахароза, что следует учитывать больным сахарным диабетом. Максимальная разовая доза препарата содержит 0.34 г сахарозы (соответствует 0.3 ХЕ (хлебных единиц)), суточная - 0,68 г (соответствует 0.68 ХЕ).

Препарат содержит не менее 37% этилового спирта. Максимальная разовая доза препарата содержит 5.9 г абсолютного этилового спирта, максимальная суточная доза препарата содержит 11,97 г абсолютного этилового спирта.

*Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами*

Ввиду наличия в составе препарата спирта этилового следует воздержаться от потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора и т.п.).

### **Условия хранения:**

При температуре от 15 до 25°C, в защищенном от света месте. Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности:**

3 года.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Kedrovit>