

Кестин (сироп)



Код АТХ:

- [R06AX22](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Эбастин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Сироп** прозрачный, бесцветный или слегка желтоватый, с запахом аниса.

	5 мл
эбастин	5 мг

Вспомогательные вещества: молочная кислота 85%, глицерола оксистеарат, неогесперидин дигидрохалкон, анетол, натрия пропилпарагидроксibenзоат, натрия метилпарагидроксibenзоат, глицерол, раствор сорбитола 70%, диметилполисилоксан, натрия гидроксид, вода дистиллированная.

60 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с мерным устройством в виде шприца - пачки картонные.
120 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с мерным устройством в виде шприца - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Интермедянты](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противоаллергический препарат. После приема препарата внутрь выраженное противоаллергическое действие начинается через 1 ч и длится в течение 48 ч. После 5-дневного курса лечения Кестином антигистаминная активность сохраняется в течение 72 ч за счет действия активных метаболитов. Препарат не оказывает выраженного антихолинергического и седативного эффекта. Не отмечено влияния Кестина на интервал QT ЭКГ даже в дозе 80 мг.

Фармакокинетика

После приема внутрь быстро всасывается и почти полностью метаболизируется в печени, превращаясь в активный метаболит карэбастин.

После однократного приема 5 или 10 мг препарата C_{max} карэбастина в плазме достигается через 2,8-3,4 ч и

Кестин (сироп)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

составляет 108-209 нг/мл. Жирная пища ускоряет абсорбцию (концентрация в крови возрастает до 50%).

Не проникает через гемато-энцефалитический барьер.

Выводится почками - 60-70%, в виде конъюгатов.

При почечной недостаточности $T_{1/2}$ возрастает до 23-26 ч, при печеночной недостаточности - до 27 ч.

Показания к применению:

— аллергический ринит сезонный и/или круглогодичный (вызванный бытовыми, пыльцевыми, эпидермальными, пищевыми, лекарственными аллергенами);

— крапивница (может быть вызвана бытовыми, пыльцевыми, эпидермальными, пищевыми, инсектными, лекарственными аллергенами, воздействием солнца, холода и др.);

— аллергические заболевания и состояния, обусловленные повышенным высвобождением гистамина.

Относится к болезням:

- [Аллергический ринит](#)
- [Аллергия](#)
- [Крапивница](#)
- [Ринит](#)

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к препарату;

— беременность, период грудного вскармливания.

С осторожностью: при печеночной и/или почечной недостаточности, в детском возрасте (до 6 лет).

Способ применения и дозы:

Дети от 6-ти до 12 лет: 5 мг (5 мл) 1 раз в сутки.

Дети от 12-ти до 15 лет: 10 мг (10 мл) 1 раз в сутки.

Взрослым и детям старше 15 лет назначают 10-20 мг (10-20 мл) 1 раз в сутки.

Суточная доза 20 мг назначается по рекомендации врача.

Кестин принимают независимо от приема пищи.

Побочное действие:

Головная боль, сухость во рту. В редких случаях - диспепсия, тошнота, бессонница, сонливость, абдоминальные боли. Астенический синдром, синусит.

Передозировка:

Специального антидота для препарата не существует. В случае передозировки рекомендуется промывание желудка, наблюдение за жизненно важными функциями организма. Симптоматическое лечение.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Безопасность применения Кестина у беременных женщин не исследована, поэтому принимать Кестин во время беременности не рекомендуется. Кормящим матерям не рекомендуется принимать Кестин, поскольку выделение

эбастина в грудное молоко не изучено.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не рекомендуется назначать Кестин одновременно с кетоконазолом и эритромицином. Кестин не взаимодействует с теофиллином, непрямыми антикоагулянтами, циметиданом, диазепамом, этанолом и этанолсодержащими препаратами.

Особые указания и меры предосторожности:

При нарушении функции печени суточная доза не должна превышать 10 мг.

С осторожностью применять у пациентов, с увеличенным QT-интервалом, гипокатиемией.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Кестин не влияет на способность управлять транспортными средствами и механизмами.

При нарушениях функции почек

С осторожностью при почечной недостаточности.

При нарушениях функции печени

С осторожностью при печеночной недостаточности.

При нарушении функции печени суточная доза не должна превышать 10 мг.

Применение в детском возрасте

С осторожностью детям до 6 лет.

Условия хранения:

При температуре от 15° до 25°С в защищенном от света месте, недоступном для детей. Срок годности - 2 года

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Kestin_sirop