# Кетодексал



## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

***Форма выпуска, описание и состав***

***Раствор для в/в и в/м введения*** прозрачный, бесцветный.

| | **1 мл** |
|---|---|
| декскетопрофен (в форме трометамола) | 25 мг |

Вспомогательные вещества: этанол 96% - 100 мг, натрия хлорид - 4 мг, натрия гидроксида раствор 1М - до pH 7.4±0.1, вода д/и - до 1 мл.

2 мл - ампулы темного стекла (5) - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

НПВС. Обладает противовоспалительным, анальгезирующим и жаропонижающим действием. Механизм действия основывается на угнетении синтеза простагландинов вследствие подавления ЦОГ.

Анальгезирующее действие наступает через 30 мин после приема, длительность действия - 4-6 ч.

***Фармакокинетика***

После приема препарата внутрь $C_{max}$ декскетопрофена у человека достигается в среднем через 30 мин (15-60 мин). Связывание с белками плазмы - 99%. Средний $V_d$ - менее 0.25 л/кг. $T_{1/2}$ составляет 1.65 ч. Подвергается метаболизму. Выводится главным образом почками в виде метаболитов.

## Показания к применению:

Болевой синдром легкой и средней интенсивности при следующих заболеваниях и состояниях: острые и хронические воспалительные заболевания опорно-двигательного аппарата (ревматоидный артрит, спондилоартрит, артроз, остеохондроз); дисменорея; зубная боль.

## Относится к болезням:

- Артрит

- Артроз
- Дисменорея
- Зубная боль
- Остеохондроз
- Ревматоидный артрит
- Спондилоартрит

## Противопоказания:

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, желудочно-кишечные кровотечения, активные кровотечения различного генеза, повышенная кровоточивость, терапия антикоагулянтами, болезнь Крона, неспецифический язвенный колит, бронхиальная астма (в т.ч. в анамнезе), тяжелая сердечная недостаточность, почечная недостаточность, печеночная недостаточность, беременность, лактация, повышенная чувствительность к декскетопрофену или другим НПВС.

## Способ применения и дозы:

Принимают внутрь. Средняя рекомендуемая разовая доза составляет 12.5 мг - 1-6 раз/сут каждые 4-6 ч по мере необходимости или 25 мг 1-3 раза/сут каждые 8 ч.

*Максимальная суточная доза* составляет 75 мг. Длительность применения - не более 3-5 дней.

Для пациентов с нарушениями функции печени или почек, лиц пожилого возраста начальная доза - не более 50 мг/сут.

## Побочное действие:

*Со стороны пищеварительной системы:* изжога, боли в животе; редко - эрозивно-язвенные поражения ЖКТ.

*Со стороны нервной системы:* головные боли, головокружение, нервозность, нарушение сна, парестезии.

*Со стороны сердечно-сосудистой системы:* сердцебиение, повышение АД.

*Аллергические реакции:* кожная сыпь, бронхоспазм.

*Прочие:* озноб, отеки конечностей, фотосенсибилизация; редко - изменение картины периферической крови, нарушения функции почек.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение при беременности и в период лактации противопоказано.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении декскетопрофена с другими НПВС возможно повышение риска развития побочных эффектов.

При одновременном применении с препаратами лития возможно повышение концентрации последнего в плазме крови.

С осторожностью применять декскетопрофен менее чем за 24 ч до начала применения или после окончания терапии метотрексатом, т.к. концентрация последнего в плазме крови (и, следовательно, токсичность) может повышаться.

Описаны отдельные случаи возникновения кровотечений при одновременном применении НПВС и антикоагулянтов.

## Особые указания и меры предосторожности:

Следует соблюдать осторожность при назначении препарата пациентам пожилого возраста, пациентам с аллергическими реакциями, с системными заболеваниями соединительной ткани и пациентам с нарушением кроветворения.

Следует проинформировать пациентов, что в случае появления побочных эффектов, а также при отсутствии

клинического эффекта в течение 3-5 дней лечения необходимо сообщить об этом лечащему врачу.

Требуется особая осторожность при одновременном применении декскетопрофена с фенитоином, сульфонамидами и препаратами, снижающими свертываемость крови.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Поскольку декскетопрофен может вызвать снижение способности к концентрации внимания, следует с осторожностью применять у пациентов, занимающихся потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенного внимания и быстроты психомоторных реакций.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Ketodeksal