

## Кетоконазол



### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Кетоконазол](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндекс](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Суппозитории вагинальные** белого или белого с желтоватым оттенком цвета, формы цилиндра с заостренным концом; на срезе допускается наличие воздушного стержня или воронкообразного углубления.

|             |                |
|-------------|----------------|
|             | <b>1 супп.</b> |
| кетоконазол | 400 мг         |

**Вспомогательные вещества:** бутилгидроксанизол 0.5 мг, глицериды полусинтетические (Суппоцир-АМ) - достаточное количество для получения суппозитория массой 2000 мг.

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Кетоконазол - синтетическое противогрибковое средство широкого спектра действия для местного применения.

Активное вещество - кетоконазол, производное имидазолдиоксолана. Оказывает фунгицидное и фунгистатическое действие в отношении дерматофитов: *Trichophyton* spp., *Epidermophyton floccosum*, *Microsporum* spp.; дрожжевых и дрожжеподобных грибов: *Candida* spp., *Pityrosporum* spp., *Torulopsis*, *Cryptococcus* spp.; диморфных грибов и эумицетов. Препарат активен в отношении стафилококков и стрептококков.

Механизм действия заключается в угнетении биосинтеза эргостерола и изменении липидного состава мембраны грибов.

#### **Фармакокинетика**

Системная абсорбция при интравагинальном применении незначительная.

### Показания к применению:

- лечение острого и хронического рецидивирующего вагинального кандидоза;
- профилактика возникновения грибковых инфекций влагалища при пониженной резистентности организма и на

фоне лечения антибактериальными средствами и другими препаратами, нарушающими нормальную микрофлору влагалища.

## Относится к болезням:

- [Вагинит](#)
- [Инфекции](#)

## Противопоказания:

- беременность (I триместр);
- детский возраст до 12 лет (безопасность и эффективность применения не установлены);
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью применять во время II и III триместра беременности, в период лактации, а также у детей в возрасте от 12 до 18 лет.

## Способ применения и дозы:

Интравагинально. Предварительно освободив суппозиторий от контурной упаковки, вводят его глубоко во влагалище в положении лежа на спине по 1 суппозиторию в сутки в течение 3-5 дней в зависимости от течения заболевания.

При *хроническом кандидозе* применяют по 1 суппозиторию в течение 10 дней.

## Побочное действие:

Гиперемия и раздражение слизистой оболочки влагалища, зуд влагалища.

*Аллергические реакции:* кожная сыпь, крапивница.

## Передозировка:

В связи с низкой абсорбцией препарата при применении в рекомендованных (терапевтических) дозах не может быть передозировки.

Передозировка при интравагинальном применении маловероятна.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Назначение препарата противопоказано в I триместре беременности. Применение во II и III триместрах беременности и в период лактации возможно только в том случае, если потенциальная польза для матери превышает возможный риск для плода и ребенка.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При интравагинальном применении в виде суппозиториев кетоконазол практически не подвергается системной абсорбции и взаимодействие с другими лекарственными средствами маловероятно.

## Особые указания и меры предосторожности:

В редких случаях возможны аллергические реакции (гиперемия полового члена) у полового партнера.

Для снижения риска рецидива заболевания рекомендуется одновременное лечение полового партнера.

Применение суппозиториев может снижать надежность механической контрацепции (латекс-содержащие

презервативы и вагинальные диафрагмы).

*Влияние на способность управлять транспортными средствами и потенциально опасными механизмами*

Применение препарата не влияет на способность к вождению автотранспорта и управлению потенциально опасными механизмами.

**Применение в детском возрасте**

Противопоказан детям до 12 лет. С осторожностью применять у детей в возрасте от 12 до 18 лет.

**Условия хранения:**

В сухом, защищенном от света месте при температуре от 15° до 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности:**

3 года.

**Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Ketokonazol>