Ким Бальзам Жидкий



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Бальзам жидкий для наружного применения в виде прозрачной жидкости зеленого цвета с характерным запахом.

	100 мл
левоментол	39 г
метилсалицилат	4.322 г
цинеол	36.083 г
камфора рацемическая	1.7 г

Вспомогательные вещества: этанол 95% - 1.362 г, масло ароматизированное - 2.043 г, хлорофилл-медь раствор масляный 15% (подсолнечное масло) - 0.063 г, парафин жидкий - до 100 мл.

6 мл - флаконы (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, оказывает местнораздражающее (отвлекающее), противовоспалительное, антисептическое действие.

Фармакокинетика

Данные отсутствуют.

Показания к применению:

В качестве симптоматического средства в комплексной терапии:

— простудных заболеваний, сопровождающихся чувством заложенности носа, головной болью;

— мышечной боли, боли в суставах, при ушибах и растяжениях связок;

— при укусах насекомых.

Относится к болезням:

- Боли в суставах
- Головная боль
- Растяжение
- Ушиб

Противопоказания:

— бронхиальная астма, провоцируемая приемом ацетилсалициловой кислоты или другими НПВП;

— склонность к ларинго- и бронхоспазму;

— повреждение кожных покровов;

— наличие кожных заболеваний на участках предполагаемого нанесения препарата;

— детский возраст (до 5 лет);

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Наружно.

При *простудных заболеваниях* небольшое количество препарата наносят на неповрежденную кожу и втирают легкими движениями в кожу в области груди и спины 2-3 раза/сут.

При *головной боли* возможно нанесение препарата на височную и затылочную область, при *заложенности носа* - на крылья носа.

При *мышечной боли, боли в суставах,* при *ушибах и растяжениях связок* небольшое количество препарата втирают легкими движениями в кожу болезненных участков 2-3 раза/сут.

При *укусах насекомых* препарат наносят на место укуса.

Средняя продолжительность лечения составляет 5-7 дней.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции, бронхоспазм, ларингоспазм, раздражение кожи в области нанесения препарата.

Передозировка:

До настоящего времени сведений о случаях передозировки не поступало.

Применение при беременности и кормлении грудью:

В связи с отсутствием опыта применения у беременных и кормящих женщин, назначение препарата данной группе не рекомендуется.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Препарат вызывает гиперемию кожи и рефлекторно усиливает циркуляцию крови в подкожной ткани, в связи с чем совместное применение с другими препаратами локального действия может приводить к усилению их всасывания.

Метилсалицилат (при всасывании с поверхности кожи) может усиливать эффект антикоагулянтов, метотрексата.

Особые указания и меры предосторожности:

Только для наружного применения, не глотать.

Избегать попадания препарата в глаза, на слизистые оболочки носа, полости рта. При случайном попадании в глаза или на слизистые оболочки необходимо обильное промывание водой.

Не использовать при возникновении побочных эффектов.

Не применять с согревающими компрессами.

После применения препарата следует тщательно вымыть руки, если они не являются объектом для лечения.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Применение препарата не оказывает отрицательного влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т.ч. управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами и т.п.).

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 5 лет.

Условия хранения:

Препарат хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 15° до 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Не использовать по истечении срока годности.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Kim_Balzam_Zhidkiy