# Кипферон



### Код АТХ:

L03AX

#### Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель Госреестр Википедия РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

Суппозитории для вагинального или ректального	1 супп.
введения	
протеин плазмы (в т.ч. lgM, lgA, lgG)	60 мг
интерферон альфа	500 тыс.ME

<sup>5</sup> шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки бумажные.

# Фармакотерапевтическая группа:

• Иммунотропные средства

#### Фармакологические свойства:

### Фармакодинамика

Препарат обладает иммуностимулирующим, противовирусным, противогерпетическим действием.

В составе комплексной терапии применяется для лечения хламидиоза.

# Показания к применению:

Препарат применяют при лечении острых респираторных заболеваний, воспалительных заболеваний ротоглотки бактериальной и вирусной этиологии, при острых вирусных (ротавирусных) и бактериальных (сальмонеллез, дизентерия, коли-инфекция) кишечных инфекциях, дисбактериозе кишечника различного происхождения у детей; при лечении урогенитального хламидиоза у женщин, в том числе с проявлениями дизбактериоза влагалища, вульвовагинита, цервинита шейки матки, эрозии шейки матки. Применение препарата осуществляют и на фоне общепринятой специфической терапии.

#### Относится к болезням:

<sup>5</sup> шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки бумажные.

- Вульвит
- Дизентерия
- Инфекции
- Коли-инфекция
- Острые респираторные заболевания
- Сальмонеллез
- Эрозия шейки матки

### Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость отдельных компонентов, беременность и период лактации.

# Способ применения и дозы:

Суппозитории, содержащие в качестве активных веществ иммуноглобулиновый комплексный препарат (КИП) 0.2 г и интерферон альфа-2b человеческий, рекомбинантный 500000 МЕ, применяют вагинально или ректально.

При острых респираторных заболеваниях, воспалительных заболеваниях ротоглотки бактериальной и вирусной этиологии, при вирусных (ротавирусных) и бактериальных (сальмонелла, дизентерия, коло-инфекция) кишечных инфекциях у детей, бактериозе кишечника различного происхождения суппозитории назначают в зависимости от возраста больных:

- на первом году ректально 1 суппозитории в сут. (в 1 приём);
- с 1 до 3-х лет по 1 суппозиторию два раза в день;
- **после 3-х лет** по 1 суппозиторию три раза в день в течение 5-7 дней.

У больных ангинами с выраженным гнойным процессом следует курс лечения продлить до 7-8 дней.

Суппозитории применяют без специфической терапии или одновременно с ней.

**При лечении урогенитального хламидиоза у женщин** суппозитории вводят глубоко интравгинально (до контакта с задним сводом влагалища и шейкой матки) по 1-2 суппозитория, в зависимости от выраженности заболевания, два раза в день. Курс лечения составляет в среднем 10 дней; при наличии эрозии шейки матки применение препарата продолжают до её эпителизации. По показаниям курс лечения может быть повторён. Лечение следует начинать в первые дни после окончания менструации. Перед введением рекомендуется удалить слизь со слизистых оболочек влагалища и шейки матки.

### Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности и в период лактации.

# Особые указания и меры предосторожности:

#### Применение в детском возрасте

Применение возможно согласно режиму дозирования.

#### Условия хранения:

Препарат хранить при температуре от 2°C до 8°C, в недоступном для детей месте.

Срок годности - 1 год. Не использовать позже срока, указанного на упаковке.

### Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Kipferon