

[Кипферон](#)



Код АТХ:

- [L03AX](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Суппозитории для вагинального или ректального введения	1 супп.
протеин плазмы (в т.ч. IgM, IgA, IgG)	60 мг
интерферон альфа	500 тыс.МЕ

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки бумажные.

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки бумажные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Иммуностимулирующие средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат обладает иммуностимулирующим, противовирусным, противогерпетическим действием.

В составе комплексной терапии применяется для лечения хламидиоза.

Показания к применению:

Препарат применяют при лечении острых респираторных заболеваний, воспалительных заболеваний ротоглотки бактериальной и вирусной этиологии, при острых вирусных (ротавирусных) и бактериальных (сальмонеллез, дизентерия, коли-инфекция) кишечных инфекциях, дисбактериозе кишечника различного происхождения у детей; при лечении урогенитального хламидиоза у женщин, в том числе с проявлениями дисбактериоза влагалища, вульвовагинита, цервинита шейки матки, эрозии шейки матки. Применение препарата осуществляют и на фоне общепринятой специфической терапии.

Относится к болезням:

- [Вульвит](#)
- [Дизентерия](#)
- [Инфекции](#)
- [Коли-инфекция](#)
- [Острые респираторные заболевания](#)
- [Сальмонеллез](#)
- [Эрозия шейки матки](#)

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость отдельных компонентов, беременность и период лактации.

Способ применения и дозы:

Суппозитории, содержащие в качестве активных веществ иммуноглобулиновый комплексный препарат (КИП) 0.2 г и интерферон альфа-2b человеческий, рекомбинантный 500000 МЕ, применяют вагинально или ректально.

При острых респираторных заболеваниях, воспалительных заболеваниях ротоглотки бактериальной и вирусной этиологии, при вирусных (ротавирусных) и бактериальных (сальмонелла, дизентерия, коли-инфекция) кишечных инфекциях у детей, бактериозе кишечника различного происхождения суппозитории назначают в зависимости от возраста больных:

- **на первом году** ректально 1 суппозитории в сут. (в 1 приём);
- **с 1 до 3-х лет** - по 1 суппозиторию два раза в день;
- **после 3-х лет** - по 1 суппозиторию три раза в день в течение 5-7 дней.

У **больных ангинами с выраженным гнойным процессом** следует курс лечения продлить до 7-8 дней.

Суппозитории применяют без специфической терапии или одновременно с ней.

При лечении урогенитального хламидиоза у женщин суппозитории вводят глубоко интравагинально (до контакта с задним сводом влагалища и шейкой матки) по 1-2 суппозитория, в зависимости от выраженности заболевания, два раза в день. Курс лечения составляет в среднем 10 дней; при наличии эрозии шейки матки применение препарата продолжают до её эпителизации. По показаниям курс лечения может быть повторён. Лечение следует начинать в первые дни после окончания менструации. Перед введением рекомендуется удалить слизь со слизистых оболочек влагалища и шейки матки.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности и в период лактации.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение в детском возрасте

Применение возможно согласно режиму дозирования.

Условия хранения:

Препарат хранить при температуре от 2°C до 8°C, в недоступном для детей месте.

Срок годности - 1 год. Не использовать позже срока, указанного на упаковке.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Kipferon>