Кипферон (свечи)



Код АТХ:

- L03AX

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Иммуноглобулин человека нормальный IgG
- IgM
- IgA
- Интерферон альфа-2b

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] [МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] [МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

Суппозитории для вагинального или ректального введения	**1 супп.**
протеин плазмы (в т.ч. IgM, IgA, IgG)	60 мг
интерферон альфа	500 тыс.МЕ

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки бумажные.
5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки бумажные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Иммунотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — противовирусное, противовоспалительное, иммуномодулирующее, антибактериальное, антихламидийное.

Препарат сочетает антихламидийное действие специфических антител, содержащихся в КИП, и антибактериальное, противовирусное, противовоспалительное и иммуномодулирующее действие рекомбинантного интерферона альфа-2. Эффект проявляется как во внутриклеточной, так и во внеклеточной среде организма за счет прямого действия на возбудителей заболевания и стимуляции механизмов местного и общего иммунитета. Повышенное содержание белка в данной лекарственной форме обеспечивает бóльшую стабильность интерферона в присутствии агрессивных факторов секретов слизистых и отделяемого в очагах поражения кожи и слизистых оболочек..

Показания к применению:

Препарат применяют при лечении острых респираторных заболеваний, воспалительных заболеваний ротоглотки бактериальной и вирусной этиологии, при острых вирусных (ротавирусных) и бактериальных (сальмонеллез, дизентерия, коли-инфекция) кишечных инфекциях, дисбактериозе кишечника различного происхождения у детей; при лечении урогенитального хламидиоза у женщин, в том числе с проявлениями дизбактериоза влагалища, вульвовагинита, цервинита шейки матки, эрозии шейки матки. Применение препарата осуществляют и на фоне общепринятой специфической терапии.

Относится к болезням:

- Вульвит
- Дизентерия
- Дисбактериоз
- Инфекции
- Коли-инфекция
- Острые респираторные заболевания
- Сальмонеллез
- Эрозия шейки матки

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость отдельных компонентов, беременность и период лактации.

Способ применения и дозы:

Суппозитории, содержащие в качестве активных веществ иммуноглобулиновый комплексный препарат (КИП) 0.2 г и интерферон альфа-2b человеческий, рекомбинантный 500000 МЕ, применяют вагинально или ректально.

При острых респираторных заболеваниях, воспалительных заболеваниях ротоглотки бактериальной и вирусной этиологии, при вирусных (ротавирусных) и бактериальных (сальмонелла, дизентерия, коло-инфекция) кишечных инфекциях у детей, бактериозе кишечника различного происхождения суппозитории назначают в зависимости от возраста больных:

- **на первом году** ректально 1 суппозитории в сут. (в 1 приём);

- **с 1 до 3-х лет** - по 1 суппозиторию два раза в день;

- **после 3-х лет** - по 1 суппозиторию три раза в день в течение 5-7 дней.

У **больных ангинами с выраженным гнойным процессом** следует курс лечения продлить до 7-8 дней.

Суппозитории применяют без специфической терапии или одновременно с ней.

При лечении урогенитального хламидиоза у женщин суппозитории вводят глубоко интравгинально (до контакта с задним сводом влагалища и шейкой матки) по 1-2 суппозитория, в зависимости от выраженности заболевания, два раза в день. Курс лечения составляет в среднем 10 дней; при наличии эрозии шейки матки применение препарата продолжают до её эпителизации. По показаниям курс лечения может быть повторён. Лечение следует начинать в первые дни после окончания менструации. Перед введением рекомендуется удалить слизь со слизистых оболочек влагалища и шейки матки.

Побочное действие:

Не зарегистрировано.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан при беременности и в период лактации.

Условия хранения:

Препарат хранить при температуре от 2°С до 8°С, в недоступном для детей месте.

Срок годности - 1 год. Не использовать позже срока, указанного на упаковке.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Kipferon_svechi