# Кларготил



## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

◊ ***Таблетки*** белого цвета, плоскоцилиндрические, с гравировкой "L" над риской на одной стороне.

| | **1 таб.** |
|---|---|
| лоратадин | 10 мг |

*Вспомогательные вещества:* целлюлоза микрокристаллическая, лактозы моногидрат, кремния диоксид коллоидный (аэросил), магния стеарат.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Блокатор гистаминовых $H_1$-рецепторов. Оказывает противоаллергическое, противозудное, антиэкссудативное действие. Уменьшает проницаемость капилляров, предупреждает развитие отека тканей, уменьшает повышенный тонус гладкой мускулатуры. Не влияет на ЦНС.

Противоаллергический эффект развивается через 30 мин, достигая максимума через 8-12 ч, продолжительность действия - 24 ч.

***Фармакокинетика***

*Всасывание*

После приема внутрь препарат быстро всасывается из ЖКТ. Прием пищи замедляет время достижения максимальной концентрации. $C_{max}$лоратадина и его активного метаболита достигается через 1-2.5 ч после приема.

*Распределение*

Связывание с белками плазмы - 97-99%. Не проникает через ГЭБ.

*Метаболизм*

Метаболизируется в печени системой цитохрома $P_{450}$ с образованием активного метаболита - дескарбоэтоксилоратадина.

*Выведение*

Средний $T_{1/2}$ лоратадина составляет 8 ч, дескарбоэтоксилоратадина - около 28 ч. Лоратадин выводится с мочой и желчью.

*Фармакокинетика в особых клинических случаях*

У пациентов пожилого возраста $C_{max}$ возрастает на 50%, при алкогольном поражении печени - с увеличением тяжести заболевания.

$T_{1/2}$ увеличивается при алкогольном поражении печени.

У пациентов с хронической почечной недостаточностью и при проведении гемодиализа фармакокинетика лоратадина практически не меняется.

## Показания к применению:

— лечение сезонного и круглогодичного аллергического ринита и устранение симптомов, связанных с этими заболеваниями: чиханья, зуда слизистой оболочки носа, ринореи, ощущения жжения и зуда в глазах;

— крапивница (в т.ч. хроническая идиопатическая крапивница);

— кожные заболевания аллергического генеза (в т.ч. аллергические зудящие дерматозы) у взрослых и детей в возрасте старше 2 лет;

— псевдоаллергические реакции;

— аллергические реакции на укусы насекомых;

— зуд различной этиологии;

— аллергический конъюнктивит;

— поллиноз;

— отек Квинке.

## Относится к болезням:

- Аллергия
- Дерматит
- Зуд
- Конъюнктивит
- Крапивница
- Поллиноз
- Ринит

## Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата;

— беременность;

— лактация (грудное вскармливание).

## Способ применения и дозы:

**Взрослым (в т.ч. пожилым) и детям старше 12 лет** назначают по 10 мг (1 таб.) 1 раз/сут.

**Детям в возрасте от 2 до 12 лет с массой тела менее 30 кг** назначают по 5 мг (1/2 таб.) 1 раз/сут, **с массой тела более 30 кг** - по 10 мг (1 таб.) 1 раз/сут.

Для **пациентов с нарушениями функции печени** начальная доза составляет 5 мг/сут.

Таблетки следует принимать внутрь не менее чем за 1 ч до приема пищи, не разжевывая, запивая небольшим количеством жидкости.

## Побочное действие:

*Со стороны ЦНС и периферической нервной системы:* редко - повышенная утомляемость, тревожность, возбудимость (у детей), головокружение, головная боль, астения, сонливость, блефароспазм, дисфония, гиперкинезия, парестезии, тремор, амнезия, депрессия.

*Со стороны пищеварительной системы:* редко - сухость во рту, тошнота, рвота, гастрит, изменение вкуса, анорексия, запор или диарея, метеоризм, повышение аппетита, стоматит.

*Со стороны дыхательной системы:* редко - кашель, бронхоспазм, сухость слизистой оболочки носа, синусит.

*Со стороны органов чувств:* конъюнктивит, нарушения зрения, боль в глазах и ушах.

*Со стороны сердечно-сосудистой системы:* снижение или повышение АД; редко - сердцебиение.

*Со стороны мочевыделительной системы:* изменение цвета мочи, болезненные позывы на мочеиспускание.

*Со стороны обмена веществ:* увеличение массы тела, потливость, жажда.

*Со стороны костно-мышечной системы:* артралгия, миалгия, судороги икроножных мышц, боль в спине.

*Аллергические реакции:* редко - крапивница, зуд, фотосенсибилизация; в единичных случаях - ангионевротический отек.

*Прочие:* дерматит, дисменорея, меноррагия, вагинит, боль в груди, боль в молочных железах, лихорадка, озноб.

## Передозировка:

*Симптомы:* при приеме препарата в дозах, значительно превышающих рекомендуемые, могут отмечаться сонливость, тахикардия, головная боль.

*Лечение:* промывание желудка, индуцирование рвоты, назначение активированного угля, слабительных препаратов. При необходимости проводят симптоматическую терапию. Лоратадин не выводится из организма при гемодиализе, проведение перитонеального диализа не эффективно.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении Кларготила с эритромицином, циметидином, кетоконазолом возможно увеличение концентрации лоратадина в плазме крови (что не имеет клинического значения и не оказывает влияния на ЭКГ).

Индукторы микросомального окисления (фенитоин, этанол, барбитураты, зиксорин, рифампицин, фенилбутазон, трициклические антидепрессанты) снижают эффективность лоратадина.

Лоратадин не усиливает действие этанола.

## Особые указания и меры предосторожности:

С осторожностью следует назначать препарат при печеночной недостаточности.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

В период лечения следует воздерживаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенного внимания и быстроты психомоторных реакций.

На психофизическую активность и способность к вождению транспортных средств применение препарата в рекомендованных дозах не влияет.

***При нарушениях функции почек***

У пациентов с хронической почечной недостаточностью и при проведении гемодиализа фармакокинетика лоратадина практически не меняется.

***При нарушениях функции печени***

Для **пациентов с нарушениями функции печени** начальная доза составляет 5 мг/сут.

***Применение в детском возрасте***

**Детям в возрасте от 2 до 12 лет с массой тела менее 30 кг** назначают по 5 мг (1/2 таб.) 1 раз/сут, **с массой тела более 30 кг** - по 10 мг (1 таб.) 1 раз/сут.

## Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом защищенном от света месте при температуре не выше 25°С.

## Срок годности:

3 года.

## Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Klargotil