

## Клеоре



### Код АТХ:

- [D07XC01](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Бетаметазон](#)
- [Мочевина](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| <b>Крем для наружного применения</b> | <b>1 г</b> |
| бетаметазон (в форме валерата)       | 1 мг       |
| мочевина                             | 100 мг     |

10 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.  
15 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.  
20 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.  
25 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.  
30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Гормоны и их антагонисты](#)
- [Органотропные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Комбинированный препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

**Бетаметазон** глюкокортикостероид для наружного применения; оказывает противовоспалительное местное, противоаллергическое, противоотечное и антипролиферативное действие. При воздействии на кожу происходит предупреждение краевого скопления нейтрофилов, что приводит к уменьшению экссудации, продукции цитокинов, торможению миграции макрофагов, приводящее в конечном итоге к уменьшению процессов инфильтрации и грануляции.

**Мочевина** обладает кератолитическим (размягчающим и вызывающим отторжение рогового слоя эпидермиса) и увлажняющим эффектами. Мочевина способствует связыванию воды и размягчению рогового слоя кожи. Помимо

кератолитического действия, мочевины обладает протеолитической активностью.

Крем Клеоре оказывает противовоспалительное, противоаллергическое, антиэкссудативное, кератолитическое и противозудное действие.

## Показания к применению:

Крем Клеоре применяют для уменьшения воспалительных проявлений сухих и гиперкератических дерматозов, чувствительных к наружной глюкокортикостероидной терапии, таких как:

- псориаз;
- атопический дерматит;
- экзема (атоническая, детская, монетовидная, пруригинозная, тилотическая, дисгидротическая);
- красный плоский лишай;
- дискоидная красная волчанка;
- дерматиты различной этиологии (в т.ч. контактный дерматит);
- простой хронический лишай (ограниченный нейродермит);
- себорейный дерматит;
- диффузный нейродермит;
- зуд кожи;
- пруриго (почесуха).

## Относится к болезням:

- [Волчанка](#)
- [Дерматит](#)
- [Кератит](#)
- [Лишай](#)
- [Нейродермит](#)
- [Псориаз](#)
- [Себорея](#)
- [Экзема](#)

## Противопоказания:

- детский возраст до 2 лет;
- угревая болезнь;
- дерматиты (периоральный, токсико-аллергические, герпетиформный Дюринга);
- бактериальные, вирусные или грибковые поражения кожи (пиодермия, Herpes simplex, ветряная оспа, Herpes zoster, актиномикоз, бластомикоз, споротрихоз);
- сифилис;
- туберкулез кожи;
- трофические язвы (в том числе на фоне хронической венозной и артериальной недостаточности);
- невус;
- атерома;
- гемангиома;
- ангиокератома;
- опухоли кожи (рак кожи, эпителиома, меланома, ксантома, базалиома, саркомы, саркома Калоши);

- Готтрона карциноидный папилломатоз кожи;
- многоформная экссудативная эритема;
- пемфигус;
- доброкачественная пузырчатка;
- эозинофильная фанулема;
- фотодерматит;
- нейрофиброматоз;
- травмы кожи;
- поствакцинальные кожные реакции;
- период лактации;
- повышенная чувствительность к какому-либо из компонентов препарата.

*С осторожностью:* длительное лечение, применение на обширных участках кожи, применение окклюзионных повязок, беременность.

## Способ применения и дозы:

Наружно. Наносить тонким слоем 2 раза в день - утром и вечером на пораженные участки кожи.

Применение у **детей в возрасте до 12 лет** возможно только под медицинским наблюдением. **Детям в возрасте от 2 до 12 лет** - наносить тонким слоем на небольшой участок кожи 1 или 2 раза в день.

Продолжительность лечения и количество наносимого препарата зависит от вида и тяжести заболевания, определяется врачом.

При лечении детей, а также больных с поражениями кожи лица курс лечения не должен превышать 5 дней.

## Побочное действие:

Нежелательные явления, которые возможны при использовании местных глюкокортикостероидов: жжение, зуд, раздражение кожи, сухость кожи, фолликулит, гипертрихоз, угревая сыпь, гипопигментация.

При длительном применении и при использовании окклюзионных повязок возможны: мацерация кожи, вторичная инфекция, атрофия кожи, стрии и потница.

При появлении побочных реакций, не описанных в настоящей инструкции, следует обратиться к врачу.

## Передозировка:

*Симптомы:* длительное применение местных глюкокортикостероидов в больших дозах может вызвать угнетение функции гипофизарно-надпочечниковой системы, ведущее ко вторичной недостаточности функции надпочечников и явлениям гиперкортицизма, включая синдром Кушинга.

*Лечение:* показано соответствующее симптоматическое лечение. Острые симптомы гиперкортицизма обычно обратимы. При необходимости - коррекция электролитного дисбаланса. В случае хронической токсичности рекомендуется постепенная отмена глюкокортикостероидов.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

В связи с тем, что безопасность применения местных глюкокортикостероидов у беременных женщин не установлена, назначение этой группы лекарственных средств в период беременности оправдано только в том случае, если потенциальная польза для матери превосходит потенциальный риск для плода.

Препараты этого класса не следует использовать во время беременности в больших дозах или продолжительное

---

время.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Если на фоне применения препарата появилось раздражение кожи или повышенная чувствительность к препарату, лечение следует прекратить. В случае присоединения инфекции следует назначить соответствующую терапию.

Системная абсорбция глюкокортикостероидов и мочевины при их местном применении будет выше при использовании окклюзионных повязок, при нанесении на обширные поверхности тела.

Дети более чем взрослые подвержены риску угнетения функции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы вследствие применения местных глюкокортикостероидов, из-за большей величины отношения площади поверхности тела к его массе и, вследствие этого, повышенной абсорбции препарата.

Препарат не предназначен для применения в офтальмологии. Следует избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки.

На коже лица чаще, чем на других поверхностях тела, после длительного лечения глюкокортикостероидами местного действия могут появляться атрофические изменения. При длительном лечении препаратом его отмену рекомендуется проводить постепенно.

### **Применение в детском возрасте**

Противопоказан детям до 2 лет.

Применение у **детей в возрасте до 12 лет** возможно только под медицинским наблюдением. **Детям в возрасте от 2 до 12 лет** - наносить тонким слоем на небольшой участок кожи 1 или 2 раза в день.

При лечении детей курс лечения не должен превышать 5 дней.

## **Условия хранения:**

Хранить при температуре не выше 15 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

## **Срок годности:**

2 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Kleore>