

Климадион



Код АТХ:

- [G02CX](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Цимицифуги кистевидной корневищ экстракт](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Таблетки, покрытые оболочкой** розового цвета с коричневым оттенком, круглые, двояковыпуклые, с риской на одной стороне.

	1 таб.
сухой экстракт корневища цимицифуги (<i>Cimicifuga racemosa</i>)	20 мг
содержит цимицифуги корневищ экстракта нативного (5-10:1)	2.8 мг

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, кальция гидрофосфата дигидрат, крахмал картофельный, магния стеарат, тальк, титана диоксид, железа оксид желтый (E172), железа оксид красный (E172), макрогол, эудрагит RL 30D (аммония метакрилат сополимер 1:2:0.2 и сорбиновая кислота). *Экстрагент* - этанол 58 об.%

15 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные.

◇ **Капли для приема внутрь** светло-коричневого цвета, прозрачные, с запахом древесины; в процессе хранения возможно легкое помутнение или выпадение незначительного осадка.

	100 мл
жидкий экстракт корневища цимицифуги	12 г
что соответствует высушенного лекарственного растительного сырья	2.4 г

Вспомогательные вещества: масло мяты, этанол 35-40 об.%, натрия сахариндигидрат, вода очищенная.

50 мл - флаконы темного стекла с дозирующим капельным устройством (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Гормоны и их антагонисты](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Фитопрепарат, применяемый при климактерическом синдроме. Обладает эстрогеноподобным эффектом, проявляет седативные свойства, оказывает положительное терапевтическое воздействие на вегетативную нервную систему. Применение препарата способствует ослаблению или полному исчезновению симптомов недомогания в климактерический период.

Терапевтический эффект препарата наступает постепенно и проявляется приблизительно через 2 недели от начала приема.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Климадинон не предоставлены.

Показания к применению:

— вегето-сосудистые расстройства в период менопаузы, пре- и постменопаузе (приливы, усиление потоотделения, повышенная возбудимость, лабильность настроения, нарушение сна, апатия).

Противопоказания:

- эстрогенозависимые опухоли;
- непереносимость лактозы (для таблеток);
- алкоголизм (для капель для приема внутрь);
- индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С *осторожностью* следует назначать препарат при заболеваниях печени, эпилепсии, заболеваниях и травмах головного мозга (применение возможно только после консультации с врачом).

Способ применения и дозы:

Назначают внутрь по 30 капель или по 1 таб. 2 раза/сут в одно и тоже время (утром и вечером).

Таблетки следует проглатывать целиком, не разжевывая, запивая небольшим количеством воды. Курс лечения длительный и определяется врачом.

Побочное действие:

Возможно: редко - боли в эпигастрии, увеличение массы тела, аллергические реакции; очень редко - чувство напряжения в молочных железах, менструальноподобные кровотечения.

Передозировка:

В настоящее время случаи передозировки и интоксикации неизвестны.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат не следует применять при беременности и в период грудного вскармливания.

При наступлении беременности необходимо прекратить прием препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

В настоящее время лекарственное взаимодействие препарата Климадинон не известно.

Особые указания и меры предосторожности:

При использовании капель для приема внутрь флакон следует держать в вертикальном положении.

При хранении капель для приема внутрь возможно легкое помутнение и выпадение незначительного осадка, однако это не влияет на активность препарата.

Перед употреблением флакон следует взбалтывать.

Возможно применение препарата в форме таблеток у больных сахарным диабетом, т.к. разовая доза препарата содержит менее 0.04 ХЕ.

Капли для приема внутрь содержат 35-40% этанола (в объемном отношении).

Пациенты должны быть информированы о том, что без консультации с лечащим врачом препарат следует принимать не более 3 мес.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

При применении в рекомендуемых дозах препарат не оказывает влияния на способность к управлению транспортом и работе с машинами.

При нарушениях функции печени

С осторожностью следует назначать препарат при заболеваниях печени.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Klimadinon>