Климадинон Уно



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Цимицифуги кистевидной корневищ экстракт

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки, покрытые оболочкой*** розового цвета с коричневым оттенком, круглые, двояковыпуклые, с риской на одной стороне.

	1 таб.
сухой экстракт корневищ цимицифуги (клопогона кистевидного)	32.5 мг,
в т.ч. нативный экстракт корневищ цимицифуги (4.5-8.5:1)	6.5 мг

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, целлюлозы порошок, кремния диоксид высокодисперсный, магния стеарат, крахмал кукурузный, кальция гидрофосфата дигидрат, натрия карбоксиметилкрахмал (тип А), метилгидроксипропилцеллюлоза (гипромеллоза), макрогол 4000, титана диоксид (Е171), железа оксид красный (Е172), железа оксид желтый (Е172).

Экстрагент: этанол 60%.

15 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат растительного происхождения. Обладает эстрогеноподобным эффектом, проявляет седативные свойства, оказывает положительное влияние на состояние вегетативной нервной системы. Применение препарата уменьшает или снимает вегетативные расстройства климактерического периода. Терапевтический эффект Климадинона Уно наступает постепенно и проявляется приблизительно через 2 недели.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Климадинон Уно не предоставлены.

Показания к применению:

— вегето-сосудистые и психические расстройства в менопаузе, пре- и постменопаузе (в т.ч. приливы, повышенное потоотделение, нарушение сна, повышенная нервная возбудимость, изменение настроения, апатия).

Противопоказания:

— эстрогенозависимые опухоли;

— непереносимость лактозы;

— беременность;

— период лактации (грудного вскармливания);

— индивидуальная повышенная чувствительность к препарату.

С *осторожностью* следует назначать препарат при нарушениях функции печени (пациенты, имеющие в анамнезе заболевания печени, должны проконсультироваться с врачом перед приемом препарата).

Способ применения и дозы:

Препарат назначают по 1 таб. 1 раз/сут, по возможности, в одно и тоже время суток (утром или вечером). Таблетки запивают небольшим количеством жидкости.

Курс терапии составляет в среднем около 3 мес. Вопрос о необходимости увеличения продолжительности приема решается врачом индивидуально.

Побочное действие:

Редко: транзиторные боли в желудке, аллергические реакции.

Передозировка:

Симптомы: усиление побочных явлений со стороны ЖКТ (боли в животе).

Лечение: отмена препарата; при необходимости проводят симптоматическую терапию.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат не следует применять при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

До настоящего времени лекарственное взаимодействие препарата Климадинон Уно не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

При назначении препарата больным сахарным диабетом следует учитывать, что 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит 0.01 ХЕ.

Пациентка должна быть проинформирована, что при нарушении или возобновлении менструаций, а также при продолжительных или вновь возникающих жалобах следует обратиться к врачу.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

При применении в рекомендуемых дозах препарат не влияет на способность к управлению транспортом и работе с машинами.

При нарушениях функции печени

С *осторожностью* следует назначать препарат при нарушениях функции печени.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С. Срок годности – 3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Klimadinon_Uno