

Климактоплан



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ **Таблетки** серые (до светло-серых), плоскоцилиндрические, с фаской, без особого запаха, в редких случаях могут иметь вкрапления.

	1 таб.
Cimicifuga D2	25 мг
Sepia D2	25 мг
Lachesis D5	25 мг
Ignatia D3	25 мг
Sanguinaria D2	25 мг

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, тальк, магния стеарат, крахмал пшеничный.

20 шт. - блистеры (5) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Гомеопатический препарат, применяемый при климактерическом синдроме. Оказывает эстрогеноподобное действие за счет связывания с эстрогеновыми рецепторами гипоталамических нейронов (воздействуя на систему гипоталамус-гипофиз-яичники). Это приводит к снижению секреции лютеинизирующего гормона (ЛГ) передней долей гипофиза. Снижение выброса гонадотропинов ведет к устранению психоэмоциональных и вегето-сосудистых нарушений (таких как приливы, тахикардия, повышенная нервная возбудимость, головокружение, головная боль), возникающих в преклимактерический и климактерический периоды и обусловленных резким снижением продукции эстрогенов с одновременным увеличением секреции ЛГ и ФСГ.

Препарат оказывает также седативное действие, нормализует сон и настроение.

Препарат не предназначен для заместительной терапии.

Фармакокинетика

Фармакокинетика препарата Климактоплан не изучена.

Показания к применению:

— в составе комплексной терапии климактерического синдрома (приливы, усиление потоотделения, сердцебиение, головокружение, зуд, нервное напряжение, нарушения сна).

Относится к болезням:

- [Зуд](#)

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат назначают по 1-2 таб. 3 раза/сут. Таблетки следует принимать за 30 мин до или через 30 мин после приема пищи, медленно рассасывая.

Побочное действие:

Возможны: аллергические реакции.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Климактоплан не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

При необходимости применения препарата Климактоплан при беременности и в период лактации следует соотнести предполагаемую пользу для матери и потенциальный риск для плода.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Климактоплан не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

При применении Климактоплана возможно временное ухудшение состояния. В данном случае пациентка должна прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Пациентка должна быть информирована, что в случае отсутствия терапевтического эффекта препарат следует отменить и проконсультироваться с врачом.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом месте при комнатной температуре.

Срок годности:

4 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Климактоплан

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Источник: <http://drugs.thead.ru/Klimaktoplan>