Клималанин



Код АТХ:

- G02CX

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Бета-аланин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Таблетки плоскоцилиндрические, белого цвета.

	1 таб.
β-аланин	400 мг

Вспомогательные вещества: магния стеарат - 8 мг, глицерина пальмитил стеарат - 31.2 мг, кремний гидратированный - 36 мг, крахмал пшеничный - 304.8 мг.

10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.
15 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Метаболики

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противоклимактерический препарат. Аминокислота β-аланин противодействует резкому высвобождению гистамина, но не обладает антигистаминной активностью, т.к. не вызывает блокаду гистаминовых H_1-рецепторов.

Препарат оказывает прямое воздействие на расширение периферических кожных сосудов, которое обуславливает вегетативные реакции при климаксе (приливы, ощущение тепла, жара, головную боль). Эти вазомоторные реакции обусловлены активностью терморегуляторных центров в гипоталамусе вследствие нарушений баланса церебральных нейротрансмиттеров, возникающих при прекращении секреции гормонов яичниками. Препарат способствует насыщению периферических рецепторов нейротрансмиттеров.

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата Клималанин не представлены.

Показания к применению:

— "приливы" в период менопаузы.

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат назначают внутрь по 1-2 таб. ежедневно. При необходимости доза может быть увеличена до 3 таб./сут. Длительность терапии составляет от 5-10 дней до исчезновения "приливов". При возобновлении симптомов следует провести повторный курс терапии.

Побочное действие:

Редко: аллергические реакции.

Передозировка:

Данные по передозировке препарата не предоставлены.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Привыкание к препарату не возникает, терапия может проводиться на протяжении всего периода вазомоторных клинических нарушений.

Применение в детском возрасте

Препарат не используется у детей.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25°C.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Klimalanin