

## [Клиндацин \(крем\)](#)



### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Клиндамицин](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

**Крем вагинальный 2%** от белого до белого с желтоватым или кремоватым оттенком цвета, допустим слабый специфический запах.

	<b>5 г (1 доза)</b>
клиндамицина фосфат	100 мг

**Вспомогательные вещества:** натрия бензоат, масло касторовое, 1,2-пропиленгликоль, полиэтиленоксид (в качестве эмульгатора).

20 г - тубы алюминиевые (1) в комплекте с аппликаторами (3 шт.) - пачки картонные.

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Антибиотик группы линкозамидов для вагинального применения. Механизм действия препарата связан с нарушением внутриклеточного синтеза белка в микробной клетке на уровне 50S субъединицы рибосом.

Клиндамицин обладает широким спектром действия, оказывает бактериостатическое действие, в более высоких концентрациях в отношении некоторых микроорганизмов - бактерицидное. Активен в отношении микроорганизмов, вызывающих бактериальные вагинозы: *Gardnerella vaginalis*, *Mobiluncus* spp., *Bacteroides* spp., *Mycoplasma hominis*, *Peptostreptococcus* spp. К клиндамицину не чувствительны *Trichomonas vaginalis* и *Candida albicans*.

#### **Фармакокинетика**

После однократного интравагинального введения 100 мг клиндамицина, в среднем 4% от введенной дозы подвергается системной абсорбции.  $C_{max}$  клиндамицина в плазме крови составляет 20 нг/мл.

### **Показания к применению:**

— бактериальный вагиноз, вызванный чувствительными к препарату микроорганизмами.

## Относится к болезням:

- [Вагинит](#)

## Противопоказания:

— повышенная чувствительность к клиндамицину или линкомицину.

## Способ применения и дозы:

Вводится интравагинально с помощью аппликатора.

Рекомендуемая разовая доза составляет 100 мг клиндамицина (один полный аппликатор), предпочтительно перед сном в течение 3-7 дней.

## Побочное действие:

Возможно развитие аллергических реакций, появление раздражения в месте введения, цервицит, вагинит, вульвовагинальный кандидоз.

## Передозировка:

При интравагинальном применении препарата передозировка не установлена.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Клинических исследований по применению клиндамицина у женщин в I триместре беременности не проводилось, поэтому применение препарата возможно только в том случае, когда ожидаемая польза для матери превышает риск для плода. Применение во II и III триместрах беременности возможно, так как не обнаружено какого-либо неблагоприятного влияния на плод.

Неизвестно, выделяется ли клиндамицин с молоком матери при интравагинальном применении, поэтому следует сопоставить пользу от применения препарата в период грудного вскармливания и возможный риск для младенца.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Между клиндамицином и эритромицином отмечено антагонистическое взаимодействие. Существует перекрестная резистентность между клиндамицином и линкомицином.

## Особые указания и меры предосторожности:

При длительном применении препарата возможен избыточный рост нечувствительных к нему микроорганизмов, в особенности грибов рода *Candida*.

Учитывая возможность минимальной системной абсорбции препарата (приблизительно 4 %), нельзя исключить возникновение на фоне применения препарата диареи. В этом случае препарат следует отменить.

Не рекомендуется применять одновременно с другими интравагинальными средствами.

Эффективность и безопасность клиндамицина при интравагинальном применении у детей не установлена.

### **Применение в детском возрасте**

Эффективность и безопасность клиндамицина при интравагинальном применении у детей не установлена.

## Условия хранения:

## **Клиндацин (крем)**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Список Б. В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 20 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности:**

3 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Klindacin\\_krem](http://drugs.thead.ru/Klindacin_krem)