

## Клиндовит



### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Клиндамицин](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

◇ **Гель для наружного применения 1%** бесцветный, почти прозрачный, со специфическим запахом; допускается наличие опалесценции.

	<b>1 г</b>
клиндамицин (в форме фосфата)	10 мг

*Вспомогательные вещества:* метилпарагидроксибензоат (нипагин), аллантаин, токоферола фосфата лаурилимнодипропионат динатрия, пропиленгликоль, макрогол 400 (полиэтиленоксид 400), карбомер (сополимер, интерполимер), натрия гидроксид, вода очищенная.

30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Антибиотик из группы линкозамидов. *Активен в отношении* всех штаммов *Propionibacterium acnes*, МПК - 0.4 мкг/мл.

Ингибирует синтез белка в микробной клетке за счет взаимодействия с 50S-субъединицами рибосом.

Клиндамицина фосфат не активен *in vitro*, но после нанесения на кожу быстро гидролизруется фосфатазами в протоках сальных желез с образованием клиндамицина, обладающего антибактериальной активностью. После нанесения на кожу количество свободных жирных кислот на поверхности кожи уменьшается примерно с 14% до 2%.

#### Фармакокинетика

После нанесения на кожу клиндамицин быстро накапливается в комедонах у больных акне, где проявляет антибактериальную активность. Средняя концентрация антибиотика в содержимом комедонов после нанесения геля значительно превышает показатель МПК для всех штаммов *Propionibacterium acnes* - возбудителя угревой сыпи.

После нанесения на кожу 1% геля клиндамицина фосфата в сыворотке крови и моче определяются очень низкие концентрации клиндамицина.

## Показания к применению:

— лечение угревой сыпи (*acne vulgaris*).

## Противопоказания:

- болезнь Крона;
- язвенный колит (в т.ч. в анамнезе);
- псевдомембранозный колит (в т.ч. в анамнезе);
- повышенная чувствительность к клиндамицину или линкомицину.

С *осторожностью* следует применять препарат у пациентов в возрасте до 12 лет (данные по безопасности и эффективности отсутствуют), в период лактации (грудного вскармливания), а также у пациентов, предрасположенных к развитию аллергических реакций, и при одновременном приеме миорелаксантов.

## Способ применения и дозы:

Препарат применяют наружно. Гель наносят тонким слоем на пораженную часть предварительно очищенной и высушенной кожи 2-3 раза/сут.

Для получения терапевтического эффекта лечение следует продолжать в течение 6-8 недель, а при необходимости можно продолжить до 6 месяцев.

## Побочное действие:

*Местные реакции:* возможно раздражение (в месте нанесения), жжение, зуд, сухость кожи, эритема, шелушение, повышенное выделение кожного сала, контактный дерматит.

*Системные реакции:* псевдомембранозный энтероколит (вероятность развития имеется при системной абсорбции клиндамицина).

Препарат обычно хорошо переносится.

## Передозировка:

Сведения о передозировке препарата Клиндовит отсутствуют.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Клиндовит можно применять наружно при беременности, если предполагаемая польза терапии для матери превышает потенциальный риск для плода.

При необходимости применения в период лактации грудное вскармливание рекомендуется прекратить.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клиндамицин и эритромицин являются антагонистами, поэтому не рекомендуется одновременное назначение этих антибиотиков.

Существует перекрестная резистентность между клиндамицином и линкомицином.

Клиндамицин может усиливать действие миорелаксантов, нарушая нервно-мышечную передачу.

## Особые указания и меры предосторожности:

---

## **Клиндовит**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

При применении следует избегать контакта препарата с глазами и полостью рта, а после нанесения геля необходимо вымыть руки.

### **Применение в детском возрасте**

С *осторожностью* следует применять препарат у пациентов в возрасте до 12 лет (данные по безопасности и эффективности отсутствуют).

### **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 15° до 25°С.

### **Срок годности:**

2 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Klindovit>