

## [Клофелин \(капли\)](#)



### **Код АТХ:**

- [C02AC01](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Клонидин](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Вегетотропные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

При закапывании раствора клонидина в конъюнктивальный мешок снижение внутриглазного давления происходит вследствие местного адреностимулирующего действия, в результате которого уменьшается продукция внутриглазной жидкости и в некоторой степени улучшается ее отток, а также благодаря ослаблению симпатического тонуса, обусловленного центральным эффектом резорбтивной части препарата.

### **Показания к применению:**

Первичная открытоугольная глаукома (в качестве монотерапии или в сочетании с другими лекарственными средствами, снижающими внутриглазное давление).

### **Относится к болезням:**

- [Глаукома](#)

### **Противопоказания:**

- гиперчувствительность;
- выраженный атеросклероз сосудов головного мозга;

## **Клофелин (капли)**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

— артериальная гипотензия.

### **Способ применения и дозы:**

Закапывают в конъюнктивальный мешок по 1-2 капли 2-4 раза/сут. Лечение начинают с назначения 0.25% раствора. В случае недостаточного снижения внутриглазного давления используют 0.5% раствор. При развитии побочных явлений, связанных с использованием 0.25% раствора, назначают 0.125% раствор.

### **Побочное действие:**

*Местные реакции:* сухость конъюнктивы, зуд или жжение в глазах.

*Системные реакции:* сухость во рту, сонливость, слабость, запоры, снижение АД, брадикардия. Обычно эти эффекты постепенно ослабевают и через несколько дней могут пройти.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Не следует назначать вместе с антидепрессантами и большими дозами антипсихотических средств (нейролептиков).

### **Особые указания и меры предосторожности:**

При отсутствии эффекта в течение первых 1-2 дней препарат отменяют.

Для уменьшения системного действия препарата после инстилляций необходимо на 1-2 мин прижать пальцем область слезного мешка.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Klofelin\\_kapli](http://drugs.thead.ru/Klofelin_kapli)