Клостерфрау МЕЛИСАНА



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат растительного происхождения, обладающий седативным и снотворным эффектом; оказывает слабое спазмолитическое, противовоспалительное и анальгезирующее действие, нормализует функции вегетативной нервной системы.

Показания к применению:

Внутрь:

— тревожность;

— нарушения сна;

— головная боль;

— желудочно-кишечные расстройства, связанные с невротическими нарушениями (метеоризм, ощущение тяжести в желудке);

— простудные заболевания.

Наружно:

— люмбаго;

— ишиас;

— миалгия после физической нагрузки;

— гингивит;

— астения.

Относится к болезням:

- Астения

- Ишиас
- Люмбаго
- Метеоризм
- Миалгия
- Неврит
- Неврозы

Противопоказания:

— гиперчувствительность.

При приеме внутрь:

— язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

— язвенный колит;

— заболевания печени;

— детский возраст до 18 лет.

При наружном применении:

— детский возраст до 12 лет.

Способ применения и дозы:

Для приема внутрь 5-15 мл концентрата разводят в двойном количестве жидкости (вода, сок, чай и др.).

При *нервозности*, *желудочно-кишечных нарушениях*: по 5-10 мл перед приемом пищи; при *простудных заболеваниях*: при первых признаках - по 10 мл 3 раза в день; при *нарушениях засыпания* перед сном: по 10-15 мл с горячим чаем, горячей водой, с сахаром или медом.

Наружно, в неразбавленном виде, в качестве растирания (для чувствительной кожи развести с двойным количеством воды). Втирают в болезненное место до полного испарения препарата.

При *воспалении десен*: 5 мл разводят 10 мл воды и прополаскивают больную сторону рта в течение 2-3 мин; для продолжительной обработки на пораженное место накладывают ватный тампон, пропитанный разведенным раствором.

При *астении*: не разбавляя, втирают в височную область, натирают лоб или вдыхают пары, пропитав носовой платок концентратом.

Побочное действие:

Аллергические реакции.

Особые указания и меры предосторожности:

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Лица, профессия которых требует быстрой психической и двигательной реакции, во время работы не должны принимать препарат.

При нарушениях функции печени

Противопоказание для приема внутрь — заболевания печени.

Применение в детском возрасте

Прием препарата внутрь противопоказан детям в возрасте до 18 лет.

Наружное применение препарата противопоказано детям в возрасте до 12 лет.

Источник: http://drugs.thead.ru/Klosterfrau_MELISANA