

## Клотримазол-Акрихин



### **Код АТХ:**

- [D01AC01](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Клотримазол](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)
- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

Фармакологическое действие — антибактериальное, противогрибковое, противопротозойное, трихомонацидное.

Нарушает синтез эргостерина, клеточной мембраны грибов..

#### **Фармакодинамика**

Обладает широким спектром действия. Активен в отношении дерматофитов, дрожжевых грибов рода *Candida*; *Corynebacterium minutissimum*, *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., трихомонад.

### **Показания к применению:**

Грибковые поражения кожи и слизистых оболочек, вызванные дерматофитами, плесневыми и дрожжеподобными грибами, разноцветный лишай, эритразма, кандидозный вульвовагинит, трихомоноз, микозы, осложненные вторичной пиодермией.

### **Относится к болезням:**

- [Вульвит](#)
- [Дерматит](#)
- [Дерматофития](#)
- [Лишай](#)

- [Микоз](#)
- [Поражения кожи](#)
- [Разноцветный лишай](#)
- [Трихомоноз](#)
- [Эритразма](#)

### **Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к клотримазолу, I триместр беременности.

### **Способ применения и дозы:**

При наружном применении наносят на пораженные участки кожи 2-3 раза/сут в течение 2-4 недель.

При обработке полости рта применяют 1-2 раза/сут не более 7 дней.

Интравагинально - по 100-500 мг в течение 1-6 дней.

### **Побочное действие:**

*Местные реакции:* контактный аллергический дерматит, покраснение, чувство жжения.

### **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Противопоказан в I триместре беременности.

В *экспериментальных исследованиях* установлено, что при применении в высоких дозах клотримазол оказывает эмбриотоксическое действие.

Неизвестно, выделяется ли клотримазол с грудным молоком. Хотя клотримазол не противопоказан к применению при беременности и в период лактации, следует учитывать потенциальный риск при выборе противогрибковой терапии.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

При одновременном применении с амфотерицином В, нистатином активность клотримазола снижается.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

Лекарственные формы, предназначенные для интравагинального применения, не используются во время менструации.

Для предотвращения реинфекции необходимо одновременное лечение половых партнеров. Клотримазол не рекомендуется применять в офтальмологии.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Klotrimazol-Akrihin>