

[Коаксил](#)



Код АТХ:

- [N06AX14](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Тианептин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Нейротропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антидепрессант. Механизм антидепрессивного действия неизвестен. В отличие от других антидепрессантов, облегчает обратный нейрональный захват серотонина в коре головного мозга и в области гиппокампа. Практически не влияет на адренергические и допаминергические процессы в ЦНС. Обладает анксиолитическим и умеренным седативным действием. При умеренно выраженных эндогенных, невротических и реактивных депрессиях, тревожных состояниях различного генеза быстро улучшает настроение, уменьшает выраженность сомато-вегетативных нарушений, включая различные болевые ощущения. Способствует восстановлению сна. Не усиливает аппетит, не влияет на массу тела. При хроническом алкоголизме предупреждает рецидивы депрессии и алкогольные срывы.

Фармакокинетика

Тианептин быстро и полностью всасывается из ЖКТ. Хорошо распределяется в организме. Связывание с белками плазмы составляет около 94%. Метаболизируется в печени путем бета-окисления и N-деметилирования.

$T_{1/2}$ тианептина составляет 2.5 ч, у пациентов пожилого возраста - 3.5 ч.

Выводится из организма почками главным образом в виде метаболитов, 8% - в неизменном виде.

При почечной недостаточности, а также у пациентов старше 70 лет $T_{1/2}$ увеличивается на 1 ч. При печеночной недостаточности фармакокинетические параметры тианептина существенно не меняются (даже при наличии цирроза печени у больных с хроническим алкоголизмом).

Показания к применению:

Депрессивные состояния, в т.ч. в гериатрической практике; тревожно-депрессивные состояния с жалобами соматического характера; тревожно-депрессивные состояния у больных хроническим алкоголизмом в период абстиненции.

Относится к болезням:

- [Алкоголизм](#)
- [Депрессия](#)

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к тианептину, одновременное применение ингибиторов MAO, детский и подростковый возраст до 15 лет.

Способ применения и дозы:

При приеме внутрь для взрослых средняя терапевтическая доза - 12.5 мг 3 раза/сут перед едой.

Максимальная суточная доза при приеме внутрь для пациентов пожилого возраста с почечной недостаточностью составляет 25 мг.

Побочное действие:

Со стороны ЦНС: головная боль, головокружение, сонливость, бессонница, кошмарные сновидения, слабость, тремор.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, экстрасистолия, боли за грудиной.

Со стороны пищеварительной системы: сухость во рту, ухудшение аппетита, тошнота, рвота, метеоризм, запоры, боли в животе.

Прочие: затруднение дыхания, чувство жара, боли в мышцах и в области поясницы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Данные о безопасности тианептина при беременности отсутствуют, поэтому применение не рекомендуется. При необходимости применения в период лактации грудное вскармливание следует прекратить.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении с ингибиторами MAO возможны коллапс или внезапная артериальная гипертензия, гипертермия, судороги.

Особые указания и меры предосторожности:

С осторожностью следует применять у пациентов с указаниями в анамнезе на суицидальные попытки.

При прекращении лечения дозу снижают постепенно в течение 7-14 дней.

Применение тианептина необходимо прекратить за 24-48 ч до предстоящей хирургической операции в условиях общей анестезии. В случае экстренной хирургической помощи операцию проводят без предварительной отмены терапии под строгим врачебным контролем.

Применение тианептина возможно не ранее чем через 2 недели после отмены ингибиторов MAO. Однако ингибиторы MAO можно применять через 24 ч после отмены тианептина.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

В процессе лечения тианептином следует воздерживаться от деятельности, требующей повышенной концентрации внимания и быстрых психомоторных реакций.

Коаксил

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Применение в пожилом возрасте

Максимальная суточная доза при приеме внутрь для пациентов пожилого возраста с почечной недостаточностью составляет 25 мг.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском и подростковом возрасте до 15 лет.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Koaksil>