Когитум



Код АТХ:

- N06BX

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Ацетиламиноянтарная кислота

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Раствор для приема внутрь*** светло-желтого цвета, прозрачный, с запахом банана.

	1 мл	**1 амп.**
калия ацетиламиносукцинат	25 мг	250 мг

Вспомогательные вещества: фруктоза - 1000 мг, метилпарагидроксибензоат - 15 мг, ароматизатор банановый - 7 мг, вода очищенная - до 10 мл.

10 мл - ампулы темного стекла (10) - вкладыши упаковочные из картона (3) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Нейротропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат общетонизирующего действия. Действующим началом препарата является ацетиламиноянтарная кислота – биологически активное соединение, содержащееся в ЦНС.

Препарат способствует нормализации процессов нервной регуляции, обладает стимулирующим эффектом.

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата Когитум не предоставлены.

Показания к применению:

— в составе комплексной терапии астенического синдрома.

Относится к болезням:

- Астения

Противопоказания:

— детский возраст до 7 лет (клинические данные отсутствуют);

— беременность (недостаточность клинических данных);

— повышенная чувствительность к ацетиламиноянтарной кислоте или любому другому из компонентов препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат предназначен для приема внутрь. Доза назначается индивидуально врачом.

Для **взрослых** средняя доза составляет 3 ампулы/сут: 2 – утром и 1 – на ночь. Максимальная доза не известна.

Детям в возрасте от 7 до 10 лет рекомендуется принимать по 1 ампуле утром, **детям в возрасте от 10 до 18 лет** рекомендуется принимать по 2 ампулы утром.

Средняя продолжительность лечения у детей и взрослых составляет 3 недели.

Если по каким-либо причинам была пропущена одна или более доз препарата, то лечение может быть продолжено без необходимости вторичной коррекции дозы.

Лечение может быть также внезапно прекращено без каких-либо серьезных последствий для пациента.

Для приема необходимо вскрыть ампулу с одной стороны, затем, подставив под вскрытый конец стакан или чашку, отломить противоположный конец ампулы. После этого жидкость беспрепятственно выльется в подставленную емкость. Вкусовые качества препарата позволяют использовать его без предварительного разведения. В случае его разведения водой возможна потеря бананового вкуса. Наиболее предпочтителен утренний прием препарата.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Когитум не сообщалось. Не ожидается развития токсических эффектов.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение при беременности противопоказано (в связи с недостаточностью клинических данных).

На время лечения препаратом грудное вскармливание следует прекратить.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Взаимодействие препарата Когитум с другими лекарственными препаратами не отмечено.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат можно применять у пациентов пожилого возраста.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Нет данных. Маловероятно, что препарат может повлиять на способность к управлению транспортными средствами, механизмами или занятию другими потенциально опасными видами деятельности.

Применение в пожилом возрасте

Препарат можно применять у пациентов пожилого возраста.

Применение в детском возрасте

Противопоказано применение у детей в возрасте до 7 лет (клинические данные отсутствуют).

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С. Срок годности **-** 3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Kogitum