

## [Кокарбоксилаза-Эллара](#)



### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Кокарбоксилаза](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Кофермент, образующийся в организме из тиамина. Оказывает метаболическое действие, активирует тканевой обмен. В организме фосфорилируется с образованием моно-, ди- и трифосфорных эфиров; кокарбоксилаза входит в состав ферментов, катализирующих карбоксилирование и декарбоксилирование кетокислот, пировиноградной кислоты, способствует образованию ацетил-коэнзима А, что определяет ее участие в углеводном обмене. Участие в пентозном цикле опосредованно способствует синтезу нуклеиновых кислот, белков и липидов.

Улучшает усвоение глюкозы, трофику нервной ткани, способствует нормализации функций сердечно-сосудистой системы.

Дефицит кокарбоксилазы вызывает повышение уровня пировиноградной и молочной кислот в крови, что приводит к ацидозу и ацидотической коме.

### **Показания к применению:**

В составе комбинированной терапии: метаболический ацидоз, ацидоз при гипергликемической коме, ацидоз при дыхательной и легочно-сердечной недостаточности; хроническая сердечная недостаточность, ИБС, нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, постинфарктный кардиосклероз; печеночная и/или почечная недостаточность, острый и хронический алкоголизм, отравления, интоксикация сердечными гликозидами и барбитуратами, инфекционные болезни (дифтерия, скарлатина, брюшной тиф, паратифы), невралгия, рассеянный склероз, периферические невриты.

У детей в период новорожденности: перинатальная гипоксическая энцефалопатия, дыхательная недостаточность, пневмония, сепсис, гипоксия, ацидоз.

### **Относится к болезням:**

- [Алкоголизм](#)
- [Дифтерия](#)
- [Интоксикация](#)

- [Инфаркт миокарда](#)
- [Инфекции](#)
- [Кардиосклероз](#)
- [Кардит](#)
- [Миокардит](#)
- [Невралгия](#)
- [Неврит](#)
- [Пневмония](#)
- [Рассеянный склероз](#)
- [Сепсис](#)
- [Сердечная недостаточность](#)
- [Скарлатина](#)
- [Склерит](#)
- [Стенокардия](#)
- [Энцефалит](#)

### **Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к кокарбоксилазе.

### **Способ применения и дозы:**

Взрослым вводят в/м или в/в. Доза составляет 50-200 мг/сут. При сахарном диабете (ацидоз, кома) суточная доза может составлять 0.1-1 г. Частота и длительность применения зависит от показаний.

Детям - в/м, в/в (капельно или струйно), новорожденным - сублингвально. Детям до 3 мес - 25 мг/сут, от 4 мес до 7 лет - 25-50 мг/сут, от 8 до 18 лет - 50-100 мг/сут. Длительность лечения - от 3-7 до 15 дней.

### **Побочное действие:**

*Возможно:* аллергические реакции (крапивница, зуд).

*При в/м введении:* возможны гиперемия, зуд, отек в месте инъекции.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Усиливает кардиотоническое действие сердечных гликозидов и улучшает их переносимость.

### **Особые указания и меры предосторожности:**

#### ***Применение в детском возрасте***

Применение возможно согласно режиму дозирования.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Kokarboksilaza-Ellara>