Колбиоцин



Код АТХ:

- S01AA20

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Колистиметат натрия
- Ролитетрациклин
- Хлорамфеникол

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн] [мнн] [мнн] Википедия[мнн] [мнн] [мнн] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Порошок для приготовления глазных капель, при растворении которого в приложенном растворителе образуется 5 мл бесцветного или светло-желтого прозрачного раствора.

	1 мл готового р-ра
хлорамфеникол	4 мг
колистиметат натрий	180 тыс.МЕ
ролитетрациклин	5 мг

Вспомогательные вещества: натрия сульфит.

Состав растворителя: вода дистиллированная стерильная, бензалкония хлорид, натрия тетраборат, борная кислота, натрия эдетат, полисорбат 80.

Флаконы темного стекла (1) с крышкой-резервуаром и крышкой-капельницей - фольга алюминиевая - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства
- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный антибактериальный препарат для местного применения в офтальмологии.

Хлорамфеникол - антибиотик широкого спектра действия, ингибирует синтез белков чувствительных микроорганизмов; *активен в отношении* грамположительных и грамотрицательных бактерий, Mycoplasma spp.,

Rickettsia spp., Chlamydia spp.; *не активен в отношении* Pseudomonas aeruginosa, грибов.

Ролитетрациклин - антибиотик широкого спектра действия, ингибируя синтез белка бактерий на уровне РНК, оказывает бактериостатическое действие. *Активен в отношении* грамотрицательных бактерий, Chlamydia spp., Mycoplasma spp., Rickettsia spp., Entamoeba histolytica. Устойчивость микроорганизмов развивается медленно.

Колистиметат натрий — антибиотик, который выделяют из Bacillus polymixa, var. colistinus. Оказывает бактерицидное действие на большинство грамотрицательных бактерий (в т.ч. Pseudomonas spp., Haemophilus spp.); *активен в отношении* грибов. Отсутствует перекрестная устойчивость с антибиотиками широкого спектра действия, с которыми колистиметат натрий проявляет синергизм.

Показания к применению:

— конъюнктивиты (катаральный, гнойный, трахомный);

— блефариты;

— блефароконъюнктивиты;

— бактериальные кератиты;

— септическая язва роговицы;

— дакриоцистит.

Относится к болезням:

- Блефарит
- Блефароконъюнктивит
- Близорукость (миопия)
- Дакриоцистит
- Кератит
- Трахома
- Язва
- Язва роговицы

Противопоказания:

— нарушение функции печени;

— нарушение функции почек;

— беременность;

— период лактации (грудное вскармливание);

— детский возраст до 8 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат назначают по 1-2 капли 3-4 раза/сут.

Правила приготовления и использования глазных капель

Снять крышку с флакона и приспособить к нему резервуар. Вдавить красную крышку резервуара во флакон, затем энергично взболтать флакон, чтобы растворить находящийся в нем порошок. Удалить полностью резервуар и надеть капельницу (пипетку) на флакон. Снять колпачок с капельницы (пипетки) и, перевернув флакон, выдавить каплю.

Побочное действие:

Местные реакции: кратковременная гиперемия конъюнктивы, ощущение жжения.

Аллергические реакции: ангионевротический отек, крапивница, буллезный и пятнисто-папулезный дерматит; у предрасположенных пациентов возможно развитие приступов бронхиальной астмы и других тяжелых аллергических реакций (из-за содержащегося в глазных каплях натрия сульфита).

Передозировка:

О случаях передозировки препарата Колбиоцин не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Колбиоцин с другими препаратами для местного применения не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

При отсутствии существенного клинического улучшения в течение относительно короткого периода времени или при появлении аллергических реакций Колбиоцин следует отменить и провести соответствующую противоаллергическую терапию.

Т.к. были зарегистрированы редкие случаи гипоплазии костного мозга вследствие длительного местного применения хлорамфеникола, Колбиоцин следует применять в течение коротких промежутков времени и под наблюдением офтальмолога.

При нарушениях функции почек

Противопоказан при нарушении функции почек

При нарушениях функции печени

Противопоказан при нарушении функции печени.

Применение в детском возрасте

Препарат противопоказан детям до 8 лет.

Условия хранения:

Список Б. Препарат следует хранить при температуре не выше 25°С. После вскрытия флакона препарат следует хранить в холодильнике при температуре от 2° до 8°С и использовать в течение 15 дней.

Условия отпуска из аптек

Препарат отпускается по рецепту.

Срок годности:

2 года.

Источник: http://drugs.thead.ru/Kolbiocin