

[Колбиоцин \(мазь\)](#)



Код АТХ:

- [S01AA20](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Колистиметат натрия](#)
- [Ролитетрациклин](#)
- [Хлорамфеникол](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Мазь глазная полутвердая, желтого цвета.

	1 г
хлорамфеникол	10 мг
колистиметат натрия	180 тыс.МЕ
тетрациклин	5 мг

Вспомогательные вещества: масло вазелиновое, ланолин, вазелин глазной.

5 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)
- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный антибактериальный препарат для местного применения в офтальмологии.

Хлорамфеникол - антибиотик широкого спектра действия, ингибирует синтез белков чувствительных микроорганизмов; *активен в отношении* грамположительных и грамотрицательных бактерий, *Mycoplasma spp.*, *Rickettsia spp.*, *Chlamydia spp.*; *не активен в отношении* *Pseudomonas aeruginosa*, грибов.

Тетрациклин - антибиотик широкого спектра действия, ингибируя синтез белка бактерий на уровне РНК, оказывает бактериостатическое действие. *Активен в отношении* грамотрицательных бактерий, *Chlamydia spp.*, *Mycoplasma spp.*, *Rickettsia spp.*, *Entamoeba histolytica*. Устойчивость микроорганизмов развивается медленно.

Колбиоцин (мазь)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Колистиметат натрия — антибиотик, который выделяют из *Bacillus polymixa*, var. *colistinus*. Оказывает бактерицидное действие на большинство грамотрицательных бактерий (в т.ч. *Pseudomonas* spp., *Haemophilus* spp.); *активен в отношении* грибов. Отсутствует перекрестная устойчивость с антибиотиками широкого спектра действия, с которыми коллистиметат натрия проявляет синергизм.

Показания к применению:

- конъюнктивиты (катаральный, гнойный, трахомный);
- блефариты;
- блефароконъюнктивиты;
- бактериальные кератиты;
- септическая язва роговицы;
- дакриоцистит.

Относится к болезням:

- [Блефарит](#)
- [Блефароконъюнктивит](#)
- [Близорукость \(миопия\)](#)
- [Дакриоцистит](#)
- [Кератит](#)
- [Трахома](#)
- [Язва](#)
- [Язва роговицы](#)

Противопоказания:

- нарушение функции печени;
- нарушение функции почек;
- беременность;
- период лактации (грудное вскармливание);
- детский возраст до 8 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Глазную мазь следует закладывать в нижний конъюнктивальный мешок 3-4 раза/сут. Если применение мази сочетается с использованием глазных капель, то мазь можно применять только 1 раз/сут (перед сном).

Побочное действие:

Местные реакции: кратковременная гиперемия конъюнктивы, ощущение жжения.

Аллергические реакции: ангионевротический отек, крапивница, буллезный и пятнисто-папулезный дерматит.

Передозировка:

О случаях передозировки препарата Колбиоцин не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Колбиоцин с другими препаратами для местного применения не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

При отсутствии существенного клинического улучшения в течение относительно короткого периода времени или при появлении аллергических реакций Колбиоцин следует отменить и провести соответствующую противоаллергическую терапию.

Т.к. были зарегистрированы редкие случаи гипоплазии костного мозга вследствие длительного местного применения хлорамфеникола, Колбиоцин следует применять в течение коротких промежутков времени и под наблюдением офтальмолога.

При нарушениях функции почек

Противопоказан при нарушении функции почек

При нарушениях функции печени

Противопоказан при нарушении функции печени.

Применение в детском возрасте

Препарат противопоказан детям до 8 лет.

Условия хранения:

Список Б. Препарат следует хранить при температуре не выше 25°C. После вскрытия упаковки препарат следует использовать в течение 30 дней.

Условия отпуска из аптек

Препарат отпускается по рецепту.

Срок годности:

3 года.

Источник: http://drugs.thead.ru/Kolbiocin_maz