

Колломак



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Оказывает кератолитическое действие - способствует отторжению рогового слоя кожи.

Показания к применению:

- бородавки;
- мозоли;
- ороговение кожи;
- оmozолелость;
- остроконечные кондиломы;
- гиперкератоз при псориазе (в т.ч. ладонно-подошвенном).

Относится к болезням:

- [Кератит](#)
- [Кондиломы](#)
- [Псориаз](#)

Противопоказания:

- гиперчувствительность (в т.ч. к салициловой кислоте);
- младенческий возраст.

С осторожностью: ХПН.

Способ применения и дозы:

Наружно, по 1 капле 1-2 раза/сут. Максимальная суточная доза для **взрослых** - 2 г (по салициловой кислоте), что соответствует 10 мл препарата; для **детей** - 0.2 г (1 мл препарата).

Для лечения оmozолелостей перед нанесением препарата рекомендуется принять теплую ножную ванну.

Курс лечения при использовании препарата в максимальных суточных дозах - не более 1 нед, при лечении оmozолелости - 3-4 дня.

Побочное действие:

Жжение и гиперемия в месте нанесения, кожные аллергические реакции.

Передозировка:

Симптомы: местнораздражающее действие.

Лечение: обильное промывание водой.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Допустимо применение препарата при беременности на ограниченной поверхности (не более 5 см²), а также в период лактации (следует избегать случайного приема младенцем препарата внутрь при контакте с обработанной поверхностью).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Салициловая кислота может повысить проницаемость кожи для других лекарственных средств для наружного применения.

Усиливает побочные действия метотрексата, действие пероральных гипогликемических средств - производных сульфонилмочевины.

Особые указания и меры предосторожности:

Не наносить на родимые пятна, волосистые бородавки, бородавки с локализацией на лице и в области гениталий, на слизистые оболочки (в т.ч. глаз). В случае попадания на соответствующие области, следует промыть большим количеством воды.

После применения следует плотно закрыть флакон.

При лечении детей следует избегать одновременной обработки нескольких участков кожи.

При нарушениях функции почек

С осторожностью: ХПН.

Применение в детском возрасте

Противопоказание — младенческий возраст.

При лечении детей следует избегать одновременной обработки нескольких участков кожи.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Kollomak>