Колломак



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Оказывает кератолитическое действие - способствует отторжению рогового слоя кожи.

Показания к применению:

— бородавки;

— мозоли;

— ороговение кожи;

— омозолелость;

— остроконечные кондиломы;

— гиперкератоз при псориазе (в т.ч. ладонно-подошвенном).

Относится к болезням:

- Кератит
- Кондиломы
- Псориаз

Противопоказания:

— гиперчувствительность (в т.ч. к салициловой кислоте);

— младенческий возраст.

С осторожностью: ХПН.

Способ применения и дозы:

Наружно, по 1 капле 1-2 раза/сут. Максимальная суточная доза для **взрослых** - 2 г (по салициловой кислоте), что соответствует 10 мл препарата; для **детей** - 0.2 г (1 мл препарата).

Для лечения омозолелостей перед нанесением препарата рекомендуется принять теплую ножную ванну.

Курс лечения при использовании препарата в максимальных суточных дозах - не более 1 нед, при лечении омозолелости - 3-4 дня.

Побочное действие:

Жжение и гиперемия в месте нанесения, кожные аллергические реакции.

Передозировка:

Симптомы: местнораздражающее действие.

Лечение: обильное промывание водой.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Допустимо применение препарата при беременности на ограниченной поверхности (не более 5 $см^2$), а также в период лактации (следует избегать случайного приема младенцем препарата внутрь при контакте с обработанной поверхностью).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Салициловая кислота может повысить проницаемость кожи для других лекарственных средств для наружного применения.

Усиливает побочные действия метотрексата, действие пероральных гипогликемических средств - производных сульфонилмочевины.

Особые указания и меры предосторожности:

Не наносить на родимые пятна, волосистые бородавки, бородавки с локализацией на лице и в области гениталий, на слизистые оболочки (в т.ч. глаз). В случае попадания на соответствующие области, следует промыть большим количеством воды.

После применения следует плотно закрыть флакон.

При лечении детей следует избегать одновременной обработки нескольких участков кожи.

При нарушениях функции почек

С осторожностью: ХПН.

Применение в детском возрасте

Противопоказание — младенческий возраст.

При лечении детей следует избегать одновременной обработки нескольких участков кожи.

Источник: http://drugs.thead.ru/Kollomak