

## [Колофорт](#)



### Код АТХ:

- [A03A](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#)

### Форма выпуска:

Таблетки для рассасывания. В контурной ячейковой упаковке из пленки ПВХ и фольги алюминиевой, 20 шт. 1, 2 или 5 контурных ячейковых упаковок в пачке из картона.

### Состав:

Таблетки для рассасывания	1 табл.
<i>активные вещества:</i>	
антитела к человеческому ФНО- $\alpha$ аффинно очищенные*	0,006 г
антитела к мозгоспецифическому белку S-100 аффинно очищенные*	0,006 г
антитела к гистамину аффинно очищенные*	0,006 г
<i>вспомогательные вещества:</i> лактозы моногидрат; МКЦ; магния стеарат	
* наносятся на лактозу в виде смеси трех активных водно-спиртовых разведений субстанции, разведенной соответственно в 100 <sup>12</sup> , 100 <sup>30</sup> , 100 <sup>200</sup> раз	

## Описание:

Таблетки плоскоцилиндрической формы с риской и фаской, от белого до почти белого цвета. На плоской стороне с риской нанесена надпись «MATERIA MEDICA», на другой — надпись «KOLOFORT».

## Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

## Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — регулирующее функции ЖКТ.

### Фармакодинамика

Экспериментально показано, что компоненты препарата модифицируют активность лиганд-рецепторного взаимодействия эндогенных регуляторов с соответствующими рецепторами: антитела к белку S-100 — к серотониновым рецепторам и сигма-1 рецепторам; антитела к ФНО- $\alpha$  — к рецептору ФНО- $\alpha$ ; антитела к гистамину — к локализованным в ЖКТ H<sub>4</sub>-гистаминовым рецепторам.

Сочетание трех активных компонентов позволяет осуществлять комплексное воздействие на центральные и периферические звенья патогенеза функциональных нарушений кишечника, в т.ч. абдоминального болевого синдрома.

*Антитела к белку S-100* обладают широким спектром психотропной активности, включая анксиолитический и антидепрессивный, антиастенический и ноотропный эффекты, что клинически проявляется в устранении внутреннего напряжения, тревоги, нормализации ряда висцеральных функций, в т.ч. деятельности толстого кишечника. Не оказывают седативное действие, не вызывают привыкание, синдром отмены.

*Антитела к ФНО- $\alpha$*  оказывают выраженное противовоспалительное действие, способствуют нормализации баланса провоспалительных и противовоспалительных цитокинов.

*Антитела к гистамину* оказывают спазмолитическое, противовоспалительное, противоотечное действие.

Сочетанное применение компонентов в составе комплексного препарата способствует нормализации нервной и гуморальной регуляции функции кишечника, снижению висцеральной гиперчувствительности рецепторов толстой кишки к растяжению, обеспечивая восстановление нарушенной моторики ЖКТ; купированию ощущения вздутия живота и переполнения желудка; уменьшению выраженности болевого синдрома. Спазмолитическое действие препарата проявляется расслаблением гладкой мускулатуры и уменьшением тонуса стенки ЖКТ, снижением внутрипросветного давления, нормализацией консистенции стула, его частоты и сопутствующих симптомов (в т.ч. купирование императивных позывов, тенезмов, чувства неполного опорожнения кишечника; уменьшение дополнительных усилий при акте дефекации).

### Фармакокинетика

Чувствительность современных физико-химических методов анализа (газожидкостная хроматография, высокоэффективная жидкостная хроматография, хромато-масс-спектрометрия) не позволяет оценивать содержание сверхмалых доз антител в биологических жидкостях, органах и тканях, что делает технически невозможным изучение фармакокинетики препарата Колофорт.

## Показания к применению:

- синдром раздраженного кишечника;
- функциональные нарушения ЖКТ.

## Относится к болезням:

- [Синдром раздраженного кишечника](#)

## Противопоказания:

- повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

## **Способ применения и дозы:**

Препарат принимают внутрь, 2 раза/сут. На один прием - 1 или 2 таблетки (держать во рту до полного растворения - не во время приема пищи).

Курс лечения составляет 1-3 месяца; при необходимости курс лечения можно продлить до 6 месяцев и/или повторить через 1-2 месяца.

На фоне обострения заболеваний возможно увеличение частоты приема до 4 раз/сут на срок от 7 до 14 дней.

## **Побочное действие:**

Возможны реакции повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата.

## **Передозировка:**

При случайной передозировке возможны диспепсические явления, обусловленные входящими в состав препарата наполнителями.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

До настоящего времени не зарегистрированы случаи несовместимости с другими лекарственными средствами.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Диагнозы

- Болезнь Крона
- Боли в животе
- Гастрит
- Диарея

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Не применять по истечении срока годности.

## **Срок годности:**

3 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Kolofort>