# Колофорт



# Код АТХ:

• <u>A03A</u>

### Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель Госреестр Википедия РЛС VIDAL Mail.Ru

# Форма выпуска:

Tаблетки для рассасывания. В контурной ячейковой упаковке из пленки ПВХ и фольги алюминиевой, 20 шт. 1, 2 или 5 контурных ячейковых упаковок в пачке из картона.

# Состав:

| Таблетки для рассасывания  | 1 табл. |
|--|---------|
| активные вещества:   |         |
| антитела к человеческому ΦΗΟ-α аффинно очищенные*  | 0,006 г |
| антитела к мозгоспецифическому белку S-100 аффинно очищенные*  | 0,006 г |
| антитела к гистамину аффинно очищенные*  | 0,006 г |
| вспомогательные вещества: лактозы моногидрат; МКЦ; магния стеарат  |         |
| $\ast$ наносятся на лактозу в виде смеси трех активных водно-спиртовых разведений субстанции, разведенной соответственно в $100^{12}$ , $100^{30}$ , $100^{200}$ раз |         |

#### Описание:

Таблетки плоскоцилиндрической формы с риской и фаской, от белого до почти белого цвета. На плоской стороне с риской нанесена надпись «MATERIA MEDICA», на другой — надпись «KOLOFORT».

## Фармакотерапевтическая группа:

• Органотропные средства

## Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — регулирующее функции ЖКТ.

#### Фармакодинамика

Экспериментально показано, что компоненты препарата модифицируют активность лиганд-рецепторного взаимодействия эндогенных регуляторов с соответствующими рецепторами: антитела к белку S-100 — к серотониновым рецепторам и сигма-1 рецепторам; антитела к ФНО- $\alpha$  — к рецептору ФНО- $\alpha$ ; антитела к гистамину — к локализованным в ЖКТ  $H_{\alpha}$ -гистаминовым рецепторам.

Сочетание трех активных компонентов позволяет осуществлять комплексное воздействие на центральные и периферические звенья патогенеза функциональных нарушений кишечника, в т.ч. абдоминального болевого синдрома.

Антитела к белку S-100 обладают широким спектром психотропной активности, включая анксиолитический и антидепрессивный, антиастенический и ноотропный эффекты, что клинически проявляется в устранении внутреннего напряжения, тревоги, нормализации ряда висцеральных функций, в т.ч. деятельности толстого кишечника. Не оказывают седативное действие, не вызывают привыкание, синдром отмены.

Aнтитела к  $\Phi$ HO-lpha оказывают выраженное противовоспалительное действие, способствуют нормализации баланса провоспалительных и противовоспалительных цитокинов.

Антитела к гистамину оказывают спазмолитическое, противовоспалительное, противоотечное действие.

Сочетанное применение компонентов в составе комплексного препарата способствует нормализации нервной и гуморальной регуляции функции кишечника, снижению висцеральной гиперчувствительности рецепторов толстой кишки к растяжению, обеспечивая восстановление нарушенной моторики ЖКТ; купированию ощущения вздутия живота и переполнения желудка; уменьшению выраженности болевого синдрома. Спазмолитическое действие препарата проявляется расслаблением гладкой мускулатуры и уменьшением тонуса стенки ЖКТ, снижением внутрипросветного давления, нормализацией консистенции стула, его частоты и сопутствующих симптомов (в т.ч. купирование императивных позывов, тенезмов, чувства неполного опорожнения кишечника; уменьшение дополнительных усилий при акте дефекации).

#### Фармакокинетика

Чувствительность современных физико-химических методов анализа (газожидкостная хроматография, высокоэффективная жидкостная хроматография, хромато-масс-спектрометрия) не позволяет оценивать содержание сверхмалых доз антител в биологических жидкостях, органах и тканях, что делает технически невозможным изучение фармакокинетики препарата Колофорт.

#### Показания к применению:

- синдром раздраженного кишечника;
- функциональные нарушения ЖКТ.

#### Относится к болезням:

• Синдром раздраженного кишечника

#### Противопоказания:

— повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

# Способ применения и дозы:

Препарат принимают внутрь, 2 раза/сут. На один прием - 1 или 2 таблетки (держать во рту до полного растворения - не во время приема пищи).

Курс лечения составляет 1-3 месяца; при необходимости курс лечения можно продлить до 6 месяцев и/или повторить через 1-2 месяца.

На фоне обострения заболеваний возможно увеличение частоты приема до 4 раз/сут на срок от 7 до 14 дней.

# Побочное действие:

Возможны реакции повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата.

# Передозировка:

При случайной передозировке возможны диспепсические явления, обусловленные входящими в состав препарата наполнителями.

# Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

До настоящего времени не зарегистрированы случаи несовместимости с другими лекарственными средствами.

# Особые указания и меры предосторожности:

Диагнозы

- Болезнь Крона
- Боли в животе
- Гастрит
- Диарея

## Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Не применять по истечении срока годности.

# Срок годности:

3 года.

# Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Kolofort