

[Комбутек-2](#)



Код АТХ:

- [D08AF](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Регенеранты и репаратанты](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Дерматопротекторное средство. Применяют для защиты раневых и ожоговых поверхностей, оказывает антисептическое действие, способствует развитию грануляций

Показания к применению:

- ожоги II-IIIa ст. (закрытие очищенных от мертвых тканей поверхностей);
- ожоги IIIb ст. (после удаления струпа);
- плоские гранулирующие посттравматические раны;
- трофические язвы;
- пролежни;
- аутодермопластика (подготовка ран);
- закрытие донорских участков после аутодермопластики.

Относится к болезням:

- [Ожоги](#)
- [Пролежни](#)
- [Раны](#)
- [Трофические язвы](#)

Противопоказания:

- гиперчувствительность;
- обильная раневая экссудация;
- некроз кожи;
- инфицированные раны (более 100 тыс. микробных тел на 1 г ткани).

Способ применения и дозы:

Прикладывают пластину к ране (в т.ч. после взятия кожного трансплантата) пористой поверхностью, причем края ее должны на 0.5-1 см прикрывать края раны. Пластина фиксируется 1-2 слоями марли (без ваты).

Состояние раневой поверхности контролируют ежедневно, при скудном отделяемом - 1 раз, при обильном - 2 раза/сут.

Аутодермапластику производят на участках, где под пластиной образуются сочные розовые грануляции. Оставлять на донорском участке до самоотторжения при полной эпителизации раны.

При *посттравматических ранах* рекомендуют применять после очищения раны от некротизированных тканей, при начинающемся росте здоровых грануляций и в период эпителизации небольших ран.

При *трофических язвах и пролежнях* рекомендуют применять после очищения раневой поверхности от некротических тканей и достижения низкой бактериальной обсемененности.

Побочное действие:

Вторичная инфекция; аллергические реакции.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Kombutek-2>