Комбутек-2



Код АТХ:

- D08AF

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакотерапевтическая группа:

- Регенеранты и репаранты

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Дерматопротекторное средство. Применяют для защиты раневых и ожоговых поверхностей, оказывает антисептическое действие, способствует развитию грануляций

Показания к применению:

— ожоги II-IIIa ст. (закрытие очищенных от мертвых тканей поверхностей);

— ожоги IIIb ст. (после удаления струпа);

— плоские гранулирующие посттравматические раны;

— трофические язвы;

— пролежни;

— аутодермопластика (подготовка ран);

— закрытие донорских участков после аутодермопластики.

Относится к болезням:

- Ожоги
- Пролежни
- Раны
- Трофические язвы

Противопоказания:

— гиперчувствительность;

— обильная раневая экссудация;

— некроз кожи;

— инфицированные раны (более 100 тыс. микробных тел на 1 г ткани).

Способ применения и дозы:

Прикладывают пластину к ране (в т.ч. после взятия кожного трансплантата) пористой поверхностью, причем края ее должны на 0.5-1 см прикрывать края раны. Пластина фиксируется 1-2 слоями марли (без ваты).

Состояние раневой поверхности контролируют ежедневно, при скудном отделяемом - 1 раз, при обильном - 2 раза/сут.

Аутодермапластику производят на участках, где под пластиной образуются сочные розовые грануляции. Оставлять на донорском участке до самоотторжения при полной эпителизации раны.

При *посттравматических ранах* рекомендуют применять после очищения раны от некротизированных тканей, при начинающемся росте здоровых грануляций и в период эпителизации небольших ран.

При *трофических язвах и пролежнях* рекомендуют применять после очищения раневой поверхности от некротических тканей и достижения низкой бактериальной обсемененности.

Побочное действие:

Вторичная инфекция; аллергические реакции.

Источник: http://drugs.thead.ru/Kombutek-2