

## [Кондилин](#)



### Код АТХ:

- [D06BB04](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Подофиллотоксин](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

**Раствор для наружного применения 0.5%** бесцветный, прозрачный.

	<b>1 мл</b>
подофиллотоксин	5 мг

*Вспомогательные вещества:* молочная кислота - 51.67 мг, натрия лактат - 7.79 мг, этанол - 735 мг, вода очищенная - 30.6 мг.

3.5 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с аппликаторами (30 шт.) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Местнонекротизирующий препарат. Активное вещество Кондилина - подофиллотоксин - является наиболее активным компонентом подофиллина, получаемого из растительных экстрактов. Кондилин содержит очищенный стандартизированный подофиллотоксин, чистота которого в препарате составляет 99%.

Оказывает цитостатическое действие. При местном применении вызывает некроз наружных кондилом за счет прижигающего и мумифицирующего действия.

#### Фармакокинетика

Апликация 0.01-0.05 мл 0.5% раствора подофиллотоксина приводит к появлению в сыворотке незначительных количеств активного вещества через 30-60 мин после его применения.

При применении 0.1 мл (кондиломы площадью более 4 см<sup>2</sup>) уровень подофиллотоксина в сыворотке достигает 5

## Кондилин

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

нг/мл через 1-2 ч и снижается до 3 нг/мл через 4 ч после аппликации.

При применении 0.15 мл фармакокинетические параметры подофиллотоксина отличаются от предыдущей дозы более замедленным выведением (через 12 ч в сыворотке определяется менее 1 нг/мл).

$T_{1/2}$  подофиллотоксина колеблется от 1 до 4.5 ч. Не описано случаев кумуляции активного вещества.

### Показания к применению:

— местное лечение остроконечных кондилом (Condylomata acuminata).

### Относится к болезням:

- [Кондиломы](#)

### Противопоказания:

- беременность;
- лактация;
- детский возраст до 12 лет;
- применение других препаратов, содержащих подофиллотоксин;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

### Способ применения и дозы:

Для нанесения препарата следует смочить пластиковый аппликатор в препарате так, чтобы отверстие петли заполнилось жидкостью. С помощью петли раствор наносится на кондилому. Затем аппликацию следует повторить, смачивая жидкостью все остальные кондиломы, но не более 50 раз. Кондилин должен попадать только на кондиломы, т.к. попадание препарата на здоровые участки кожи или слизистых оболочек может привести к сильному раздражению и изъязвлению. После аппликации место нанесения раствора должно хорошо просохнуть во избежание раздражения здоровой кожи, соприкасающейся с кондиломой.

Кондилин наносится 2 раза/сут в течение 3 дней, далее делается 4-дневный перерыв; возможен повторный 3-дневный курс лечения. Общая продолжительность лечения не должна превышать 5 недель.

### Побочное действие:

*Местные реакции:* возможно появление покраснения, незначительно выраженной боли, изъязвления эпителиального покрова кондиломы (обычно в начале лечения, чаще на 2-3 день применения препарата). При наличии больших кондилом в препуциальной области возможно развитие отека и баланопостита.

*Возможны* аллергические реакции.

### Передозировка:

При местном применении препарата в высоких дозах его следует смыть водой с мылом. При случайном приеме Кондилина внутрь необходимо промыть желудок, контролировать электролитный, газовый баланс, картину периферической крови, функциональное состояние печени.

### Применение при беременности и кормлении грудью:

Кондилин противопоказан к применению при беременности и в период лактации.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Лекарственное взаимодействие препарата Кондилин не описано.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Кондилин необходимо применять с осторожностью. При попадании препарата в глаза во избежание выраженного раздражения необходимо срочно промыть глаза большим количеством воды.

Перед применением Кондилина следует вымыть пораженные участки водой с мылом и хорошо просушить.

При использовании Кондилина следует избегать его попадания на здоровую кожу и слизистые оболочки, окружающие кондилому. Особую осторожность следует проявлять при локализации кондилом в области крайней плоти.

Раздражение, изъязвление кожи и слизистой оболочки вокруг кондиломы можно предотвратить при помощи защитных мазей, нейтральных кремов, вазелина, цинковой мази, которые наносят на окружающие кондиломы ткани перед аппликацией Кондилина.

При развитии отека и баланопостита возможно применение противовоспалительных препаратов (например, ГКС в форме мази).

Нанесение препарата на большую поверхность (более 10 см<sup>2</sup>) может привести к реакциям, связанным с резорбтивным действием подофиллотоксина.

Целесообразно обследование и, в случае необходимости, лечение половых партнеров. Во время лечения следует исключить половые контакты либо предусмотреть использование в этот период барьерных контрацептивов.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Не отмечено влияния препарата на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

### **Применение в детском возрасте**

Противопоказан детям до 12 лет.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Срок годности - 3 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Kondilin>