

## [Конского каштана экстракт жидкий](#)



### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Каштана конского семян экстракт](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Органотропные средства](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Тритерпеновый гликозид (сапонин) из плодов (семян) конского каштана (в виде натриевой соли). Обладает выраженной капилляропротективной активностью, оказывает антиэкссудативное действие.

#### **Фармакокинетика**

После приема внутрь 50 мг экстракта плодов конского каштана  $C_{max}$  в плазме крови достигается через 2.35 ч и составляет 25.31 нг/мл.

Связывание с белками плазмы составляет 84%.

$T_{1/2}$  составляет 19.87 ч. После приема внутрь 0.11% экстракта плодов конского каштана выводится почками в виде эсцина.

### **Показания к применению:**

Посттромбофлебитический синдром и отдельные симптомы хронической венозной недостаточности различной этиологии (в т.ч. отеки, судороги в икроножных мышцах, боли и чувство тяжести в ногах), варикозное расширение вен, трофические нарушения. Посттравматические или послеоперационные отеки мягких тканей.

### **Относится к болезням:**

- [Венозная недостаточность](#)
- [Отеки](#)
- [Судороги](#)

## **Противопоказания:**

Почечная недостаточность, I триместр беременности, повышенная чувствительность к эсцину.

## **Способ применения и дозы:**

В/в взрослым - 5-10 мг/сут, детям в возрасте до 3 лет - 100 мкг/кг/сут, от 3 до 10 лет - 200 мкг/кг/сут.

Доза для приема внутрь зависит от лекарственной формы и определяется индивидуально.

При наружном применении осторожно втирают в области поражения несколько раз в сутки.

## **Побочное действие:**

*Аллергические реакции:* кожная сыпь, крапивница, ангионевротический отек, анафилактический шок, жар.

*Со стороны пищеварительной системы:* диспепсия, тошнота.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Эсцин противопоказан к применению в I триместре беременности. Возможно применение в III триместре беременности, особенно при появлении отеков нижних конечностей и отсутствии нефропатии.

Не рекомендуется применение в период лактации (грудного вскармливания).

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

При в/в введении эсцина женщинам, принимающим гормональные противозачаточные средства, дозу растворителя следует удвоить.

При одновременном применении с эсцином возможно усиление нефротоксического действия антибиотиков группы аминогликозидов.

При одновременном применении с эсцином возможно усиление активности антикоагулянтов и других лекарственных средств с антитромботическим действием.

При одновременном применении цефалоспорины вытесняют эсцин из связей с белками плазмы.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Во время лечения следует периодически контролировать функцию почек.

### **При нарушениях функции почек**

Противопоказан при почечной недостаточности.

Во время лечения следует периодически контролировать функцию почек.

### **Применение в детском возрасте**

Применение возможно согласно режиму дозирования.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Konskogo\\_kashtana\\_ekstrakt\\_zhidkiy](http://drugs.thead.ru/Konskogo_kashtana_ekstrakt_zhidkiy)