Конского каштана экстракт жидкий



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Каштана конского семян экстракт

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Тритерпеновый гликозид (сапонин) из плодов (семян) конского каштана (в виде натриевой соли). Обладает выраженной капилляропротективной активностью, оказывает антиэкссудативное действие.

Фармакокинетика

После приема внутрь 50 мг экстракта плодов конского каштана C_{max} в плазме крови достигается через 2.35 ч и составляет 25.31 нг/мл.

Связывание с белками плазмы составляет 84%.

$T_{1/2}$ составляет 19.87 ч. После приема внутрь 0.11% экстракта плодов конского каштана выводится почками в виде эсцина.

Показания к применению:

Посттромбофлебитический синдром и отдельные симптомы хронической венозной недостаточности различной этиологии (в т.ч. отеки, судороги в икроножных мышцах, боли и чувство тяжести в ногах), варикозное расширение вен, трофические нарушения. Посттравматические или послеоперационные отеки мягких тканей.

Относится к болезням:

- Венозная недостаточность
- Отеки
- Судороги

Противопоказания:

Почечная недостаточность, I триместр беременности, повышенная чувствительность к эсцину.

Способ применения и дозы:

В/в взрослым - 5-10 мг/сут, детям в возрасте до 3 лет - 100 мкг/кг/сут, от 3 до 10 лет - 200 мкг/кг/сут.

Доза для приема внутрь зависит от лекарственной формы и определяется индивидуально.

При наружном применении осторожно втирают в области поражения несколько раз в сутки.

Побочное действие:

Аллергические реакции: кожная сыпь, крапивница, ангионевротический отек, анафилактический шок, жар.

Со стороны пищеварительной системы: диспепсия, тошнота.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Эсцин противопоказан к применению в I триместре беременности. Возможно применение в III триместре беременности, особенно при появлении отеков нижних конечностей и отсутствии нефропатии.

Не рекомендуется применение в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При в/в введении эсцина женщинам, принимающим гормональные противозачаточные средства, дозу растворителя следует удвоить.

При одновременном применении с эсцином возможно усиление нефротоксического действия антибиотиков группы аминогликозидов.

При одновременном применении с эсцином возможно усиление активности антикоагулянтов и других лекарственных средств с антитромботическим действием.

При одновременном применении цефалоспорины вытесняют эсцин из связей с белками плазмы.

Особые указания и меры предосторожности:

Во время лечения следует периодически контролировать функцию почек.

При нарушениях функции почек

Противопоказан при почечной недостаточности.

Во время лечения следует периодически контролировать функцию почек.

Применение в детском возрасте

Применение возможно согласно режиму дозирования.

Источник: http://drugs.thead.ru/Konskogo_kashtana_ekstrakt_zhidkiy