Консол



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Декстран
- Инозин
- Калия хлорид
- Кальция глюконат
- Лидокаин
- Магния сульфат
- Натрия гидрокарбонат
- Натрия хлорид

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн мнн мнн мнн мнн мнн мнн мнн] Википедия[мнн мнн мнн мнн мнн мнн мнн мнн мнн] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат. При перфузии миокарда прекращает механическую и электрическую активность сердца, предотвращает повреждение миокарда, вызываемое тотальной ишемией.

Показания к применению:

— кардиоплегия (операции, требующие остановки сердца в условиях искусственного кровообращения).

Относится к болезням:

- Кардит

Противопоказания:

— гиперчувствительность.

Способ применения и дозы:

Используют для кардиоплегической остановки сердца по двум методикам.

Первая методика - для холодовой остановки сердца используют раствор с температурой 4°С. Первоначальный объем

- в количестве 600-800 мл, с одновременным внутриперикардиальным охлаждением. Далее - каждые 20-30 мин по 200-400 мл при температуре 4°C, в зависимости от размеров сердца.

Данная методика рекомендована при проведении кардиоплегии через аппарат искусственного кровообращения.

Вторая методика - первоначально применяют раствор комнатной температуры (18-26°C) в объеме 400 мл, затем - 400 мл раствора с температурой 4°C. Одновременно проводят внутриперикардиальное охлаждение сердца. Далее - каждые 20-30 мин по 200-400 мл раствора с температурой 4°C.

При антеградной доставке через корень аорты перфузируют под давлением 50-60 мм рт.ст.

Внутриперикардиальное охлаждение во всех случаях проводят 0.9% раствором натрия хлорида в виде ледяной кашицы.

Передозировка:

Симптомы: отеки, тахикардия.

Источник: http://drugs.thead.ru/Konsol