Контрактубекс



Код АТХ:

- D03AX

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Аллантоин
- Гепарин натрия
- Лука репчатого луковиц экстракт

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн мнн мнн] Википедия[мнн мнн мнн] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Гель для наружного применения*** светло-коричневого цвета, матовый, с характерным запахом.

	1 г
жидкий экстракт лука репчатого	100 мг
гепарин натрий	50 МЕ
аллантоин	10 мг

Вспомогательные вещества: сорбиновая кислота, метилпарагидроксибензоат, камедь ксантана (нетрол F), макрогол 200 (полиэтиленгликоль 200), масло ароматизированное (дром 2700), вода очищенная.

20 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
50 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Регенеранты и репаранты

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, действие которого обусловлено свойствами входящими в его состав компонентов. Оказывает фибринолитическое, противовоспалительное (за счет экстракта луковиц Серае), антитромботическое (за счет гепарина), и кератолитическое действие (за счет аллантоина). Стимулирует клеточную регенерацию без гиперплазии. Ингибирует пролиферацию келоидных фибробластов.

Фармакокинетика

В эксперименте было показано, что гепарин в течение 4 ч в клинически достаточном количестве проникает в соединительную ткань дермы. Глубокое проникновение обеспечивается комбинацией гепарина с экстрактом луковиц Серае и аллантоином (трансэпидермальная гепаринизация).

При использовании препарата Контрактубекс системная абсорбция не наблюдается.

Показания к применению:

— гипертрофические и келоидные рубцы, возникающие после хирургических операций, ампутаций, ожогов и травм;

— анкилозы (контрактуры) суставов;

— контрактура Дюпюитрена;

— травматические сухожильные контрактуры;

— растяжки после беременности;

— атрофические рубцы (в частности, возникающие после угрей или фурункулеза);

— профилактика образований патологических рубцов в послеоперационном периоде или после травмы.

Возможно применение препарата у детей.

Относится к болезням:

- Травмы
- Фурункул

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Расход препарата в одно применение в среднем 0.5 см геля на рубцовую поверхность площадью 20-25 см^2. Применяют 2-3 раза/сут, легко втирая в рубцовую ткань. Курс лечения при свежих рубцах составляет в среднем 4 недели.

При *застарелых плотных рубцах* на ночь накладывают окклюзионную повязку с гелем. Курс лечения составляет в среднем 3-6 мес.

При *контрактуре Дюпюитрена* курс лечения составляет в среднем 12 мес.

Для *профилактики* используют фазу после эпителизации раны (на грануляции не наносят).

Побочное действие:

Редко: местные кожные реакции.

Передозировка:

Передозировка препарата Контрактубекс не описана.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Действие препарата при беременности и в период лактации не исследовалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Контрактубекс не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Для усиления действия препарат следует наносить на предварительно распаренную кожу. Возможно применение в сочетании с физиотерапевтическими мероприятиями.

При лечение свежих рубцов следует избегать ультрафиолетового облучения, воздействия холода и интенсивного массажа.

Применение в детском возрасте

Возможно применение препарата у детей.

Условия хранения:

Препарат следует хранить недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.

Срок годности:

4 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Kontraktubeks