


Контрактубекс



Код АТХ:

- [D03AX](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Аллантоин](#)
- [Гепарин натрия](#)
- [Лука репчатого луковиц экстракт](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ **Гель для наружного применения** светло-коричневого цвета, матовый, с характерным запахом.

	1 г
жидкий экстракт лука репчатого	100 мг
гепарин натрия	50 МЕ
аллантоин	10 мг

Вспомогательные вещества: сорбиновая кислота, метилпарагидроксибензоат, камедь ксантана (нетрол F), макрогол 200 (полиэтиленгликоль 200), масло ароматизированное (дром 2700), вода очищенная.

20 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

50 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Регенеранты и репаранты](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, действие которого обусловлено свойствами входящими в его состав компонентов. Оказывает фибринолитическое, противовоспалительное (за счет экстракта луковиц Серае), антитромботическое (за счет гепарина), и кератолитическое действие (за счет аллантаина). Стимулирует клеточную регенерацию без гиперплазии. Ингибирует пролиферацию келоидных фибробластов.

Фармакокинетика

В эксперименте было показано, что гепарин в течение 4 ч в клинически достаточном количестве проникает в соединительную ткань дермы. Глубокое проникновение обеспечивается комбинацией гепарина с экстрактом луковиц Серае и аллантаином (трансэпидермальная гепаринизация).

При использовании препарата Контрактубекс системная абсорбция не наблюдается.

Показания к применению:

- гипертрофические и келоидные рубцы, возникающие после хирургических операций, ампутаций, ожогов и травм;
- анкилозы (контрактуры) суставов;
- контрактура Дюпюитрена;
- травматические сухожильные контрактуры;
- растяжки после беременности;
- атрофические рубцы (в частности, возникающие после угрей или фурункулеза);
- профилактика образований патологических рубцов в послеоперационном периоде или после травмы.

Возможно применение препарата у детей.

Относится к болезням:

- [Травмы](#)
- [Фурункул](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Расход препарата в одно применение в среднем 0.5 см геля на рубцовую поверхность площадью 20-25 см².

Применяют 2-3 раза/сут, легко втирая в рубцовую ткань. Курс лечения при свежих рубцах составляет в среднем 4 недели.

При *застарелых плотных рубцах* на ночь накладывают окклюзионную повязку с гелем. Курс лечения составляет в среднем 3-6 мес.

При *контрактура Дюпюитрена* курс лечения составляет в среднем 12 мес.

Для *профилактики* используют фазу после эпителизации раны (на грануляции не наносят).

Побочное действие:

Редко: местные кожные реакции.

Передозировка:

Передозировка препарата Контрактубекс не описана.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Действие препарата при беременности и в период лактации не исследовалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Контрактубекс не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Для усиления действия препарат следует наносить на предварительно распаренную кожу. Возможно применение в сочетании с физиотерапевтическими мероприятиями.

При лечении свежих рубцов следует избегать ультрафиолетового облучения, воздействия холода и интенсивного массажа.

Применение в детском возрасте

Возможно применение препарата у детей.

Условия хранения:

Препарат следует хранить недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

4 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Kontraktubeks>