

## Контрикал



### Код АТХ:

- [B02AB01](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Апротинин](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

<b>Лиофилизат для приготовления раствора для в/в и внутривенного введения</b>	<b>1 фл.</b>
апротинин	10 000 АТрЕ

Вспомогательные вещества: маннитол.

Растворитель: изотонический р-р натрия хлорида - 2 мл.

Флаконы (5) - упаковки ячейковые контурные (2) в комплекте с растворителем (амп. 10 шт.) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Гематотропные средства](#)
- [Метаболики](#)

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Ингибитор фибринолиза. Апротинин - активное вещество препарата - является поливалентным ингибитором протеаз. Путем образования обратимых стехиометрических ферментно-ингибиторных комплексов апротинин инактивирует самые важные протеазы плазмы крови, клеточных элементов и тканей, в т.ч. плазмин, трипсин, химотрипсин, калликреин, которые играют важную роль в развитии патофизиологических реакций. Терапевтический эффект апротинина обусловлен, прежде всего, подавлением протеолитического влияния плазмина и блокадой активизации плазминогена аутогенными активаторами.

Апротинин обладает широким спектром ингибирующего действия и поэтому может применяться не только в качестве антифибринолитика, но также как профилактическое и терапевтическое средство при нарушениях других ферментных систем.

## Контрикал

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Активность апротинина выражают в калликреин инактивирующих единицах (КИЕ), а также в антитрипсиновых единицах (АТрЕ). 1 АТрЕ соответствует 1.33 КИЕ.

### Фармакокинетика

#### Распределение

После в/в введения апротинин распределяется во внеклеточном пространстве, кратковременно накапливается в печени.

#### Выведение

Выводится почками.  $T_{1/2}$  в сыворотке крови составляет 2 ч. Распад молекулы апротинина до неактивных частиц происходит за счет лизосомальной активности почек.

### Показания к применению:

- острый панкреатит;
- профилактика послеоперационного панкреатита;
- шоковые состояния;
- кровотечения, обусловленные гиперфибринолизом, в т.ч. после операций, травм; перед, во время и после родов;
- тяжелые геморрагические осложнения, возникающие при проведении тромболитической терапии.

### Относится к болезням:

- [Геморрой](#)
- [Панкреатит](#)
- [Травмы](#)
- [Тромбоз](#)
- [Фиброз](#)
- [Шок](#)

### Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- I триместр беременности.

### Способ применения и дозы:

Контрикал 10 000 вводят в/в струйно (медленно, максимально 5 мл в 1 мин) или капельно.

Содержимое 1 флакона следует растворить в 2 мл изотонического раствора натрия хлорида.

При *кровотечениях* начальная доза составляет 300 000 АТрЕ, в дальнейшем вводят по 140 000 АТрЕ через каждые 4 ч в/в струйно до нормализации гемостаза.

При *остром панкреатите* - в/в струйно 200 000-300 000 АТрЕ, затем в/в капельно - 200 000-300 000 АТрЕ/сут. Лечение проводят вплоть до нормализации клинической картины заболевания и показателей лабораторных анализов.

Для *профилактики послеоперационного панкреатита* - в/в струйно 200 000 АТрЕ/сут.

При *шоковых состояниях* препарат назначают в начальной дозе 200 000-300 000 АТрЕ, затем 140 000 в/в струйно каждые 4 ч.

**Детям** препарат назначают в дозе 14 000 АТрЕ/кг массы тела/сут.

### Побочное действие:

Со стороны сердечно-сосудистой системы: возможны артериальная гипотензия, тахикардия.

*Со стороны пищеварительной системы:* тошнота, рвота.

*Аллергические реакции:* после повторных вливаний возможны кожная сыпь, симптомы анафилактических реакций вплоть до развития анафилактического шока.

*Местные реакции:* после длительных капельных вливаний в местах введения возможен тромбофлебит.

## **Передозировка:**

В многочисленных испытаниях, проведенных на различных видах животных, даже при применении аprotинина в дозах, намного превышающих терапевтические дозы для людей, каких-либо токсических влияний не было выявлено.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Контрикал 10 000 противопоказан к применению в I триместре беременности.

Клинический опыт применения препарата в период лактации недостаточен. При необходимости применения Контрикала 10 000 в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Контрикал 10 000 при одновременном применении снижает активность стрептокиназы и урокиназы.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Перед началом терапии рекомендуется проведение кожной пробы для определения индивидуальной чувствительности к препарату.

Пациентам с повышенным риском развития аллергических реакций перед применением Контрикала 10 000 вводят антигистаминные препараты.

В случаях развития аллергических реакций и появления симптомов шока введение Контрикала 10 000 следует немедленно прекратить.

Для лечения тяжелых анафилактических реакций наряду с общепринятыми мерами по оказанию неотложной помощи немедленно вводят в/в адреналин (0.05-0.1 мг) (адреналин при необходимости вводят повторно), назначают ГКС в высоких дозах (например, 0.25-1 г преднизолона), применяют плазмозаменители.

Контрикал 10 000 не следует применять в комбинации с бета-лактамами антибиотиками.

При ДВС-синдроме применять Контрикал 10 000 можно только после устранения всех проявлений ДВС-синдрома и на фоне профилактического действия гепарина.

### ***Применение в детском возрасте***

**Детям** препарат назначают в дозе 14 000 АТрЕ/кг массы тела/сут

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить при комнатной температуре, в защищенном от света, недоступном для детей месте.

*Условия отпуска из аптек*

Препарат отпускается по рецепту.

## **Срок годности:**

3 года.

## **Контрикал**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Kontrikal>