Корилип

Код АТХ:

- A11EX

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Кокарбоксилаза
- Рибофлавин
- Тиоктовая кислота

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн мнн мнн] Википедия[мнн мнн мнн]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Суппозитории ректальные желтого цвета с возможными вкраплениями оранжево-желтого цвета,торпедообразной формы.

	1 супп.
кокарбоксилазы гидрохлорид	25 мг
рибофлавин	2 мг
тиоктовая (α-липоевая) кислота	12 мг

Вспомогательные вещества: масло какао или твердый жир.

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Метаболики

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат с общеукрепляющим действием. Комбинированный препарат, действие которого определяется эффектами, входящих в его состав витаминов и коферментов, а также синергизмом действя.

Кокарбоксилазы гидрохлорид (кофермент) катализирует карбоксилирование и декарбоксилирование α-кетокислот, участвует в процессах углеводного обмена, через участие в пентозном цикле опосредованно способствует синтезу нуклеиновых кислот, белков, липидов. Активирует тканевой обмен. Препарат используется для коррекции при метаболическом ацидозе, клеточной гипоксии, других нарушениях обмена веществ, при недостаточности функции печени, почек, сердечно-сосудистой системы, хронических интоксикациях.

Рибофлавин (витамин B_2) в качестве кофермента флавинпротеинов участвует в регулировании окислительно-восстановительных реакций, а также в процессах углеводного, белкового и жирового обмена; играет важную роль в синтезе гемоглобина и поддержании нормальной зрительной функции глаза, состояния слизистых оболочек и кожи.

Кислота липоевая участвует в окислительном декарбоксилировании пировиноградной кислоты и α-кетокислот, в регулировании липидного и углеводного обмена, играет важную роль в процессе образования энергии в организме. Липоевая кислота обладает гепатопротекторным действием, улучшает дезинтоксикационную функцию печени, защищает от воздействия экзо- и эндотоксинов.

Корилип улучшает тканевой обмен при различных физиологических и патологических состояниях, нуждающихся в коррекции кофакторами и субстратами.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Корилип не предоставлены.

Показания к применению:

В качестве монотерапии или как дополнение к базисной терапии при различных патологических состояниях у детей, в т.ч.:

— хроническая тканевая гипоксия;

— снижение иммунитета;

— бактериальные и вирусные инфекции;

— хронические соматические заболевания;

— хронические интоксикации;

— состояния после перенесенных тяжелых заболеваний;

— нарушение питания (гипотрофия).

Периоды интенсивного роста и становления новых функций у ребенка, при интенсивной физической и умственной нагрузке, при стрессовых ситуациях.

В качестве общеукрепляющего средства для профилактики в период эпидемии инфекционных заболеваний.

Относится к болезням:

- Интоксикация
- Инфекции

Противопоказания:

— проктит;

— ректальное кровотечение;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат применяют ректально. Освободив от упаковки, следует ввести суппозиторий в задний проход (после предварительного опорожнения кишечника).

Новорожденным и детям грудного возраста назначают 1/2 суппозитория/сут; **детям в возрасте от 1 года до 6 лет)** - по 1 суппозиторию/сут; **детям в возрасте от 6 до 14 лет** - 1-2 суппозитория/сут.

Длительность курса лечения - 10 дней. Общая продолжительность лечения - 3-4 курса с интервалом 20 дней (3-4 мес).

Побочное действие:

Аллергические реакции: редко - крапивница, зуд, бронхоспазм, диспепсия.

При появлении побочных реакций пациент должен прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Передозировка:

Данные о передозировке препарата Корилип не предоставлены.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Отрицательного взаимодействия не отмечалось.

Препарат может использоваться при комплексной терапии.

Особые указания и меры предосторожности:

Критериями продолжительности лечения наряду с клиническим состоянием являются цитохимические показатели активности ферментов лейкоцитов периферической крови (сукцинатдегидрогеназа и глицерофосфатдегидрогеназа).

Применение в детском возрасте

Препарат предназначен для применения у детей.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре не выше 9°С.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Korilip