

## Корилип-Нео



### **Код АТХ:**

- [A11EX](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Кокарбоксилаза](#)
- [Рибофлавин](#)
- [Тиоктовая кислота](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр](#)<sub>МНН МНН МНН</sub> [Википедия](#)<sub>МНН МНН МНН</sub>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru Drugs.com](#)<sub>англ</sub>

### **Форма выпуска:**

<b>Суппозитории ректальные</b>	<b>1 супп.</b>
кокарбоксилазы гидрохлорид	12.5 мг
рибофлавин	1 мг
тиоктовая ( $\alpha$ -липоевая) кислота	6 мг

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Метаболики](#)

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Комбинированный препарат, действие которого определяется эффектами, входящих в его состав витаминов и коферментов, а также их синергичным действием.

Кокарбоксилаза (кофермент) катализирует карбоксилирование и декарбоксилирование  $\alpha$ -кетокислот, участвует в процессах углеводного обмена. Через участие в пентозном цикле опосредованно регулирует синтез нуклеиновых кислот, белков, липидов. Способствует коррекции метаболического ацидоза и клеточной гипоксии, а также других нарушений обмена веществ (недостаточность функции печени, почек, сердечно-сосудистой системы, хронические интоксикации).

Рибофлавин (витамин B<sub>2</sub>) в качестве кофермента флавинпротеинов участвует в регулировании окислительно-восстановительных реакций (в процессах углеводного, белкового и жирового обмена). Играет важную роль в синтезе гемоглобина и в поддержании нормальной зрительной функции глаза, состояния слизистых оболочек и кожи.

Тиоктовая кислота участвует в окислительном декарбоксилировании пировиноградной кислоты и других α-кетокислот, в регулировании липидного и углеводного обмена, играет важную роль в процессе образования энергии в организме. Тиоктавая кислота обладает гепатопротекторным действием, улучшает дезинтоксикационную функцию печени, защищает от воздействия экзо- и эндотоксинов.

Корилип улучшает тканевой обмен при различных физиологических и патологических состояниях, нуждающихся в коррекции кофакторами и субстратами.

## **Показания к применению:**

Препарат показан к применению с профилактической и лечебной целью в комплексной терапии при различных патологических состояниях у детей, таких как:

- хроническая тканевая гипоксия;
- снижение иммунитета;
- бактериальные и вирусные инфекции, в том числе острые кишечные инфекции;
- хронические соматические заболевания;
- хронические интоксикации;
- нарушение питания (гипотрофия) у детей.

## **Относится к болезням:**

- [Интоксикация](#)
- [Инфекции](#)

## **Противопоказания:**

Реакция гиперчувствительности на компоненты, входящие в состав препарата.

Воспаление или кровотечение в прямой кишке (противопоказание, связанное с путем введения).

## **Способ применения и дозы:**

Препарат применяют ректально. Освободив от упаковки, ввести суппозиторий в задний проход после предварительного опорожнения кишечника.

Суппозитории назначают детям до 1 года по 1 суппозиторию в сут.

Длительность курса лечения - 10 дней. Общая продолжительность лечения — 3-4 курса с промежутком в 20 дней (3—4 месяца).

## **Побочное действие:**

Возможны аллергические реакции — крапивница, зуд, бронхоспазм, диспептические явления.

При появлении побочных реакций прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

## **Передозировка:**

Случаи передозировки не описаны.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Отрицательного взаимодействия не отмечалось. Препарат может использоваться при комплексной терапии.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Критериями продолжительности лечения наряду с клиническим состоянием являются цитохимические показатели активности ферментов лейкоцитов периферической крови (сукцинатдегидрогеназа и глицерофосфатдегидрогиназа).

### **Применение в детском возрасте**

Применение возможно согласно режиму дозирования.

### **Условия хранения:**

В защищенном от света месте при температуре не выше 20°C. Хранить в недоступном для детей месте.

*Срок годности.* 2 года. Не использовать после окончания срока годности, указанного на упаковке.

### **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Korilip-Neo>