# Корилип-Нео



## Код АТХ:

- A11EX

## Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Кокарбоксилаза
- Рибофлавин
- Тиоктовая кислота

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн мнн мнн] Википедия[мнн мнн мнн] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

| ***Суппозитории ректальные*** | **1 супп.** |
|---|---|
| кокарбоксилазы гидрохлорид | 12.5 мг |
| рибофлавин | 1 мг |
| тиоктовая (α-липоевая) кислота | 6 мг |

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

## Фармакотерапевтическая группа:

- Метаболики

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Комбинированный препарат, действие которого определяется эффектами, входящих в его состав витаминов и коферментов, а также их синергичным действием.

Кокарбоксилаза (кофермент) катализирует карбоксилирование и декарбок-силирование α-кетокислот, участвует в процессах углеводного обмена. Через участие в пентозном цикле опосредованно регулирует синтез нуклеиновых кислот, белков, липидов. Способствует коррекции метаболического ацидоза и клеточной гипоксии, а также других нарушений обмена веществ (недостаточность функции печени, почек, сердечно-сосудистой системы, хронические интоксикации).

Рибофлавин (витамин $B_2$) в качестве кофермента флавинпротеинов участвует в регулировании окислительно-восстановительных реакций (в процессах углеводного, белкового и жирового обмена). Играет важную роль в синтезе гемоглобина и в поддержании нормальной зрительной функции глаза, состояния слизистых оболочек и кожи.

Тиоктовая кислота участвует в окислительном декарбоксилировании пировиноградной кислоты и других α-кетокислот, в регулировании липидного и углеводного обмена, играет важную роль в процессе образования энергии в организме. Тиоктовая кислота обладает гепатопротекторным действием, улучшает дезинтоксикационную функцию печени, защищает от воздействия экзо- и эндотоксинов.

Корилип улучшает тканевой обмен при различных физиологических и патологических состояниях, нуждающихся в коррекции кофакторами и субстратами.

## Показания к применению:

Препарат показан к применению с профилактической и лечебной целью в комплексной терапии при различных патологических состояниях у детей, таких как:

— хроническая тканевая гипоксия;

— снижение иммунитета;

— бактериальные и вирусные инфекции, в том числе острые кишечные инфекции;

— хронические соматические заболевания;

— хронические интоксикации;

— нарушение питания (гипотрофия) у детей.

## Относится к болезням:

- Интоксикация
- Инфекции

## Противопоказания:

Реакция гиперчувствительности на компоненты, входящие в состав препарата.

Воспаление или кровотечение в прямой кишке (противопоказание, связанное с путем введения).

## Способ применения и дозы:

Препарат применяют ректально. Освободив от упаковки, ввести суппозиторий в задний проход после предварительного опорожнения кишечника.

Суппозитории назначают детям до 1 года по 1 суппозиторию в сут.

Длительность курса лечения - 10 дней. Общая продолжительность лечения — 3-4 курса с промежутком в 20 дней (3—4 месяца).

## Побочное действие:

Возможны аллергические реакции — крапивница, зуд, бронхоспазм, диспептические явления.

При появлении побочных реакций прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

## Передозировка:

Случаи передозировки не описаны.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Отрицательного взаимодействия не отмечалось. Препарат может использоваться при комплексной терапии.

## Особые указания и меры предосторожности:

Критериями продолжительности лечения наряду с клиническим состоянием являются цитохимические показатели активности ферментов лейкоцитов периферической крови (сукцинатдегидрогеназа и глицерофосфатдегидрогиназа).

***Применение в детском возрасте***

Применение возможно согласно режиму дозирования.

## Условия хранения:

В защищенном от света месте при температуре не выше 20°С. Хранить в недоступном для детей месте.

*Срок годности.* 2 года. Не использовать после окончания срока годности, указанного на упаковке.

## Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Korilip-Neo