# Корилип (свечи)



## Код АТХ:

- A11EX

## Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Кокарбоксилаза
- Рибофлавин
- Тиоктовая кислота

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн] [мнн] [мнн] Википедия[мнн] [мнн] [мнн] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

***Форма выпуска, описание и состав***

***Суппозитории ректальные*** желтого цвета с возможными вкраплениями оранжево-желтого цвета,торпедообразной формы.

| | **1 супп.** |
|---|---|
| кокарбоксилазы гидрохлорид | 25 мг |
| рибофлавин | 2 мг |
| тиоктовая (α-липоевая) кислота | 12 мг |

*Вспомогательные вещества:* масло какао или твердый жир.

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

## Фармакотерапевтическая группа:

- Метаболики

## Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — метаболическое.

## Показания к применению:

В качестве монотерапии или как дополнение к базисной терапии при различных патологических состояниях у детей, в т.ч.:

— хроническая тканевая гипоксия;

— снижение иммунитета;

— бактериальные и вирусные инфекции;

— хронические соматические заболевания;

— хронические интоксикации;

— состояния после перенесенных тяжелых заболеваний;

— нарушение питания (гипотрофия).

Периоды интенсивного роста и становления новых функций у ребенка, при интенсивной физической и умственной нагрузке, при стрессовых ситуациях.

В качестве общеукрепляющего средства для профилактики в период эпидемии инфекционных заболеваний.

## Относится к болезням:

- Интоксикация
- Инфекции

## Противопоказания:

— проктит;

— ректальное кровотечение;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

Препарат применяют ректально. Освободив от упаковки, следует ввести суппозиторий в задний проход (после предварительного опорожнения кишечника).

**Новорожденным и детям грудного возраста** назначают 1/2 суппозитория/сут; **детям в возрасте от 1 года до 6 лет)** - по 1 суппозиторию/сут; **детям в возрасте от 6 до 14 лет** - 1-2 суппозитория/сут.

Длительность курса лечения - 10 дней. Общая продолжительность лечения - 3-4 курса с интервалом 20 дней (3-4 мес).

## Побочное действие:

*Аллергические реакции:* редко - крапивница, зуд, бронхоспазм, диспепсия.

При появлении побочных реакций пациент должен прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

## Передозировка:

Данные о передозировке препарата Корилип не предоставлены.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Отрицательного взаимодействия не отмечалось.

Препарат может использоваться при комплексной терапии.

## Особые указания и меры предосторожности:

Критериями продолжительности лечения наряду с клиническим состоянием являются цитохимические показатели активности ферментов лейкоцитов периферической крови (сукцинатдегидрогеназа и глицерофосфатдегидрогеназа).

## Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре не выше 9°С.

## Срок годности:

2 года.

## Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Korilip_svechi