

[Корилип \(свечи\)](#)



Код АТХ:

- [A11EX](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Кокарбоксилаза](#)
- [Рибофлавин](#)
- [Тиоктовая кислота](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН МНН}
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

Суппозитории ректальные желтого цвета с возможными вкраплениями оранжево-желтого цвета, торпедообразной формы.

	1 супп.
кокарбоксилазы гидрохлорид	25 мг
рибофлавин	2 мг
тиоктовая (α-липоевая) кислота	12 мг

Вспомогательные вещества: масло какао или твердый жир.

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Метаболики](#)

Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — метаболическое.

Показания к применению:

В качестве монотерапии или как дополнение к базисной терапии при различных патологических состояниях у детей, в т.ч.:

— хроническая тканевая гипоксия;

- снижение иммунитета;
- бактериальные и вирусные инфекции;
- хронические соматические заболевания;
- хронические интоксикации;
- состояния после перенесенных тяжелых заболеваний;
- нарушение питания (гипотрофия).

Периоды интенсивного роста и становления новых функций у ребенка, при интенсивной физической и умственной нагрузке, при стрессовых ситуациях.

В качестве общеукрепляющего средства для профилактики в период эпидемии инфекционных заболеваний.

Относится к болезням:

- [Интоксикация](#)
- [Инфекции](#)

Противопоказания:

- проктит;
- ректальное кровотечение;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат применяют ректально. Освободив от упаковки, следует ввести суппозиторий в задний проход (после предварительного опорожнения кишечника).

Новорожденным и детям грудного возраста назначают 1/2 суппозитория/сут; **детям в возрасте от 1 года до 6 лет** - по 1 суппозиторию/сут; **детям в возрасте от 6 до 14 лет** - 1-2 суппозитория/сут.

Длительность курса лечения - 10 дней. Общая продолжительность лечения - 3-4 курса с интервалом 20 дней (3-4 мес).

Побочное действие:

Аллергические реакции: редко - крапивница, зуд, бронхоспазм, диспепсия.

При появлении побочных реакций пациент должен прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Передозировка:

Данные о передозировке препарата Корилип не предоставлены.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Отрицательного взаимодействия не отмечалось.

Препарат может использоваться при комплексной терапии.

Особые указания и меры предосторожности:

Корилип (свечи)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Критериями продолжительности лечения наряду с клиническим состоянием являются цитохимические показатели активности ферментов лейкоцитов периферической крови (сукцинатдегидрогеназа и глицерофосфатдегидрогеназа).

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре не выше 9°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Korilip_svechi?page=1