

[Корментол](#)



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Левоментола раствор в ментил изовалерате](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◇ **Капсулы подъязычные** мягкие желатиновые, овальные, от светло-желтого до светлого коричневато-желтого цвета; содержимое капсул - прозрачная бесцветная или с желтоватым оттенком маслянистая жидкость с запахом ментола.

	1 капс.
левоментола раствор в ментил изовалерате	100 мг
Вспомогательные вещества: α-токоферола ацетат (вит.Е) - 0.45 мг, масло оливковое рафинированное - q.s. до 160 мг.	

Состав оболочки капсул: желатин - 72 мг, вода очищенная - 56.2384* мг, глицерол - 31.5216 мг, метилпарагидроксибензоат (E218) - 0.24 мг.

* указано закладываемое количество воды очищенной. Вода частично испаряется в процессе производства и ее содержание в готовом продукте меньше закладываемого.

15 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Оказывает седативное действие, обладает умеренным рефлекторным сосудорасширяющим действием, обусловленным раздражением чувствительных нервных окончаний. Стимулирует выработку и освобождение

Корментол

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

энкефалинов, эндорфинов и ряда других пептидов, гистамина, кининов (за счет раздражения рецепторов слизистой оболочки), которые принимают активное участие в регуляции проницаемости сосудов, формировании болевых ощущений. При сублингвальном приеме терапевтический эффект в среднем наступает через 5 мин, при этом до 70% препарата высвобождается в течение 3 мин.

Показания к применению:

- кардиалгия;
- стенокардия;
- синдром "укачивания" (тошнота, рвота при морской и воздушной болезни);
- истерия;
- невроз;
- головная боль на фоне приема нитратов.

Относится к болезням:

- [Воздушная болезнь](#)
- [Головная боль](#)
- [Кардиалгия](#)
- [Кардит](#)
- [Неврит](#)
- [Неврозы](#)
- [Рвота](#)
- [Стенокардия](#)
- [Тошнота](#)

Противопоказания:

- гиперчувствительность.

Способ применения и дозы:

Диагнозы

- Анемия
- Артриты
- Боли в грудной клетке
- Горная болезнь

Побочное действие:

Тошнота, слезотечение, головокружение.

Особые указания и меры предосторожности:

Следует назначать с осторожностью больным сахарным диабетом (для лекарственных форм, содержащих сахар).

Источник: <http://drugs.thead.ru/Kormentol>