Корнерегель



Код АТХ:

- S01XA12

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Декспантенол

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Гель глазной 5%*** прозрачный или слегка опалесцирующий, бесцветный, легко текучий.

	1 г
декспантенол	50 мг

Вспомогательные вещества: цетримид, динатрия эдетат, карбомер, натрия гидроксид, вода д/и.

5 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
10 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Метаболики
- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Протектор роговицы. Препарат стимулирует процессы регенерации, оказывает противовоспалительное действие.

Карбомер (входящий в состав препарата) увеличивает продолжительность контакта водного раствора с эпителием роговицы, тем самым пролонгируя действие декспантенола.

Фармакокинетика

Карбомер не проникает в ткани глазного яблока вследствие высокой молекулярной массы и не абсорбируется в системный кровоток.

Показания к применению:

— эрозии роговицы;

— ожоги глаз;

— кератиты различной этиологии;

— дистрофические заболевания роговицы;

— профилактика повреждений роговицы при ношении контактных линз.

Относится к болезням:

- Кератит

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью применяют препарат у пациентов с хронической почечной недостаточностью.

Способ применения и дозы:

Гель глазной закапывают по 1 капле в нижний конъюнктивальный мешок каждого глаза 3-5 раз/сут.

При закапывании тубу следует держать вертикально над глазом, не касаясь конъюнктивы.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции, преходящее затуманивание зрения, ощущение жжения, местное раздражение глаз.

Передозировка:

Данные о передозировке препарата Корнерегель отсутствуют.

Применение при беременности и кормлении грудью:

С осторожностью следует применять Корнерегель при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

В тех случаях, когда проводится дополнительная местная терапия, интервал между введением препарата Корнерегель и других препаратов должен составлять не менее 5 мин. Корнерегель следует применять последним.

Особые указания и меры предосторожности:

В период лечения препаратом не рекомендуется ношение мягких контактных линз. При использовании контактных линз их следует снять перед применением геля и не устанавливать раньше чем через 15 мин после инстилляции препарата.

Тубу следует закрывать после каждого использования, не следует прикасаться кончиком тубы к глазу.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

В период лечения пациент должен воздерживаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

При нарушениях функции почек

С осторожностью применяют препарат у пациентов с хронической почечной недостаточностью.

Условия хранения:

Список Б. Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре не выше 25°С.

После вскрытия тубы препарат следует использовать в течение 6 недель.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Korneregel