

[Коронатера](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Пеллеты** от светло-желтого до желто-коричневого цвета, сферической формы, с запахом борнеола.

	1 пеллета
Сухой экстракт корневищ лигустикума чуансионского	18.4 мг

Вспомогательные вещества: борнеол - 3.2 мг, макрогол 6000 - 18.4 мг.

40 шт. - флаконы фарфоровые (1) - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
40 шт. - флаконы фарфоровые (2) - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
40 шт. - блистеры (4) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат обладает антиангинальным действием, улучшает коронарный кровоток и уменьшает потребность миокарда в кислороде.

Показания к применению:

— в комплексной терапии больных ишемической болезнью сердца (стабильная стенокардия напряжения I-II функционального класса).

Относится к болезням:

- [Стенокардия](#)

Противопоказания:

— острые приступы стенокардии;

Коронатера

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

- детский возраст (до 18 лет);
- беременность;
- период лактации;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Внутри **взрослым** по 10 пеллет 3 раза в день до еды. Курс лечения 4 недели. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно после согласования с врачом.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции, головная боль, изжога, отрыжка, горечь во рту, сухость во рту, тошнота, рвота, послабляющее действие, одышка, повышенная нервная возбудимость, нарушения сна.

Передозировка:

Явления передозировки не описаны.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано применение при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Для купирования приступов стенокардии Коронатера не применяется. Препарат следует применять только по назначению врача и под его контролем.

Применение в детском возрасте

Противопоказание: детский возраст (до 18 лет).

Условия хранения:

Хранить при температуре от 12° до 25°С в защищенном от света месте. Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Koronatera>