

Кортомицетин



Код АТХ:

- [D07CA01](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Гидрокортизон](#)
- [Хлорамфеникол](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Мазь для наружного применения	1 г
гидрокортизона ацетат	5 мг
хлорамфеникол	2 мг

15 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Гормоны и их антагонисты](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, обладает противовоспалительным, антиаллергическим и противомикробным действием.

Показания к применению:

Воспалительные и аллергические заболевания кожи (в т.ч. осложненные микробной инфекцией, чувствительной к действию хлорамфеникола):

- микробная экзема;
- атопический дерматит (распространенный нейродермит);
- аллергический дерматит;

Кортомицетин

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

- псориаз;
- пиодермия.

Относится к болезням:

- [Аллергия](#)
- [Атопический дерматоз](#)
- [Дерматит](#)
- [Инфекции](#)
- [Нейродермит](#)
- [Псориаз](#)
- [Экзема](#)

Противопоказания:

- гиперчувствительность к компонентам препарата;
- туберкулез кожи;
- грибковые и вирусные заболевания кожи;
- нарушение целостности кожных покровов;
- беременность.

Способ применения и дозы:

Мазь наносят тонким слоем на пораженные участки кожи 2-3 раза/сут. Суточная доза (в зависимости от площади поражения) составляет от 2 до 30 г.

Под окклюзионную повязку наносят 1 раз/сут с соответствующим уменьшением суточной дозы.

Курс лечения зависит от характера заболевания и эффективности терапии, может продолжаться от 7 до 30 дней, составляя в среднем 7-10 дней.

Побочное действие:

Возможно возникновения зуда, гиперемии в месте нанесения препарата, обострение кожно-воспалительных заболеваний.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан при беременности.

Условия хранения:

Список Б. Хранить в недоступном для детей месте, при температуре не выше 20°C.

Не использовать препарат после истечения срока годности.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Кортомицетин

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Источник: <http://drugs.thead.ru/Kortomicetin>